

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Fucidin® pommade et crème

LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.

Qu'est-ce que Fucidin et quand doit-il être utilisé?

Fucidin est un antibiotique utilisé sur prescription médicale pour combattre et prévenir les infections bactériennes au niveau de la peau.

Fucidin pommade est appliquée en cas d'infections cutanées et de brûlures.

Fucidin crème convient particulièrement bien aux infections du visage et du cuir chevelu.

Quand Fucidin ne doit-il pas être utilisé?

Vous ne devez pas utiliser Fucidin en cas d'hypersensibilité connue au principe actif acide fusidique, fusidate de sodium ou à l'un des excipients selon la composition (voir aussi «Que contient Fucidin?»).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Fucidin?

Si l'affection cutanée ne s'améliore pas après quelques jours de traitement, veuillez consulter votre médecin; une allergie ou une infection provoquée par des germes résistants peuvent en être l'origine.

Lors d'application de Fucidin sur le visage le contact avec les yeux doit être évité.

Fucidin pommade contient de l'alcool cétylique, de la graisse de laine et du butylhydroxytoluène (E 321) qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales (par ex. dermite de contact). Le butylhydroxytoluène (E 321) peut aussi provoquer une irritation des yeux et des muqueuses.

Fucidin crème contient de l'alcool cétylique, du sorbate de potassium (E 202) et du butylhydroxyanisole (E 320) qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales (par ex. dermite de contact). Le butylhydroxyanisole (E 320) peut aussi provoquer une irritation des yeux et des muqueuses.

Lors de traitement par Fucidin-crème dans la région génitale ou anale et d'utilisation simultanée de préservatifs en latex, une diminution de la résistance à la déchirure et donc une diminution de la sécurité du préservatif est possible, en raison de la présence des excipients paraffine et vaseline.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication !).

Fucidin peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte, si vous désirez le devenir ou si vous allaitez, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser Fucidin. Si Fucidin est prescrit par le médecin pendant l'allaitement, le médicament ne doit pas être appliqué sur la poitrine.

Comment utiliser Fucidin?

Sauf prescription contraire de votre médecin, appliquer Fucidin pommade comme pansement 1 à 2 fois par jour sur la peau infectée. Si un pansement est difficile (p.ex. dans le visage), appliquer la pommade 3 fois par jour sur la zone affectée de la peau. Un traitement de 7 jours suffira dans la plupart des cas.



Sauf prescription contraire du médecin, appliquer Fucidin crème 2 à 3 fois par jour pendant 7 jours sur les zones affectées de la peau.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Fucidin peut-il provoquer?

L'utilisation de Fucidin peut provoquer les effets secondaires suivants:

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Des inflammations de la peau (y compris de l'eczéma), des éruptions cutanées (qui peuvent s'accompagner de pustules, de vésicules et de rougeurs), des démangeaisons, une rougeur de la peau, des douleurs (y compris une sensation de brûlure de la peau) ou une irritation au site d'application ont été observés.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Des réactions d'hypersensibilité, des inflammations de la conjonctive, un angio-œdème (gonflement soudain, indolore de la peau et de la muqueuse), urticaire ou formation de vésicules.

En cas de survenue de réactions d'hypersensibilité, surtout si celles-ci s'accompagnent d'un gonflement de la peau et des muqueuses, ainsi qu'en cas de survenue d'urticaire ou de formation de vésicules, veuillez en informer immédiatement votre médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Fucidin pommade: à utiliser dans les 3 mois après ouverture.

Fucidin crème: à utiliser dans 1 mois après ouverture.

Remarques concernant le stockage

Conserver hors de portée des enfants. Tenir Fucidin crème et pommade bien fermé et ne pas conserver au-dessus de 30°C.

Remarques complémentaires

Les médicaments périmés doivent être rapportés en pharmacie pour être éliminés correctement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Fucidin?

Principes actifs

Pommade: 1 g de pommade contient 20 mg de fusidate de sodium.

Crème: 1 g de crème contient 20 mg d'acide fusidique.

Excipients

Pommade: de la vaseline blanche, de la paraffine liquide, de la graisse de laine, de l'alcool cétyle, du butylhydroxytoluène (E 321), de l'alpha-tocophérol.

Crème: de l'alcool cétyle, de la glycérine, de la paraffine liquide, du polysorbate 60, de la vaseline blanche, de l'alpha-tocophérol, de l'acide chlorhydrique, du sorbate de potassium (E 202), du



butylhydroxyanisole (E 320).

Numéro d'autorisation

34370, 46898 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Fucidin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Vous obtenez Fucidin pommade et crème en pharmacie, sur ordonnance médicale.

Pommade et crème: tubes de 15 g et de 30 g.

Titulaire de l'autorisation

LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Kloten

Domicile: Zurich

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

