

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Fucidin® unguento et crema

LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.

Che cos'è Fucidin e quando si usa?

Fucidin è un antibiotico che viene somministrato su prescrizione del medico nella lotta e nella prevenzione delle infezioni batteriche della pelle.

Fucidin unguento viene impiegato nel trattamento delle infezioni cutanee e delle ustioni.

Fucidin crema è specialmente adatta alla cura delle infezioni del viso e del cuoio capelluto.

Quando non si può usare Fucidin?

In caso di una ipersensibilità esistente all'acido fusidico, al fusidato di sodio o ad una delle sostanze ausiliarie seconda la composizione non deve usare i medicinali Fucidin (vedere anche «Cosa contiene Fucidin»).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Fucidin?

Consulti il medico se nel giro di pochi giorni una malattia cutanea non risponde al trattamento; un'allergia o un'infezione di germi ipersensibili potrebbero esserne la causa.

In caso di applicazione di Fucidin sul viso, evitare il contatto con gli occhi.

Fucidin unguento contiene alcool cetilico, lanolina e idrossitoluene butilato (E 321), che possono causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto). Il idrossitoluene butilato (E 321) può inoltre causare irritazione agli occhi e alle mucose.

Fucidin crema contiene alcool cetilico, sorbato di potassio (E 202) e idrossianisolo butilato (E 320), che possono causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto). Il idrossianisolo butilato (E 320) può inoltre causare irritazione agli occhi e alle mucose.

In caso di trattamento con Fucidin crema della regione genitale o anale e di uso concomitante di preservativi in lattice, le sostanze ausiliarie paraffina e vaselina contenute nella crema possono ridurre la resistenza dei preservativi e di conseguenza anche la loro sicurezza.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Fucidin durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta, desidera diventarlo o sta allattando, usi Fucidin solo dopo aver consultato il medico. Se Fucidin è prescritto dal medico durante l'allattamento, il medicamento non deve essere applicato sul seno.

Come usare Fucidin?

Salvo diversa prescrizione del suo medico, Fucidin unguento viene applicato quotidianamente come bendaggio unguento 1-2 volte al giorno sulla pelle infetta. Se non è possibile fare un bendaggio unguento, applicare l'unguento 2-3 volte al giorno. Un trattamento della durata di 7 giorni è sufficiente nella maggioranza dei casi.



Salvo diversa indicazione del medico, Fucidin crema è applicata sulla parte interessata 2-3 volte al giorno durante 7 giorni.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Fucidin?

Con l'applicazione di Fucidin possono manifestarsi gli effetti collaterali seguenti:

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

Infiammazioni cutanee (incluso eczemi), eruzioni cutanee (possono accompagnate da pustole, vescicole e arrossamento), prurito, arrossamento cutaneo, dolore (compresa la sensazione di bruciore sulla pelle) o irritazione nel punto di applicazione.

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10 000)

Reazioni di ipersensibilità, congiuntivite, angioedema (gonfiore e dolore improvviso di pelle e mucose), orticaria o formazione di bolle.

Alla comparsa di reazioni di ipersensibilità, in particolare se accompagnate da gonfiore di pelle e mucose, come pure alla comparsa di orticaria e bolle, informi immediatamente il suo medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Fucidin unguento: utilizzare entro 3 mesi dopo l'apertura.

Fucidin crema: utilizzare entro 1 mese dopo l'apertura.

Istruzioni di conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere Fucidin crema e unguento ben chiuso e non conservare a temperature superiori a 30°C.

Ulteriori indicazioni

È opportuno riportare i medicinali scaduti in farmacia, affinché siano eliminati.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Fucidin?

Principi attivi

Unguento: 1 g di unguento contiene 20 mg di sodio fusidato.

Crema: 1 g di crema contiene 20 mg di acido fusidico.

Sostanze ausiliarie

Unguento: vasellina bianca, paraffina liquida densa, cera di lana anidra, alcool cetilico, idrossitoluene butilato (E 321), alfa-tocoferolo.

Crema: alcool cetilico, glicerolo, paraffina liquida densa, polisorbato 60, vasellina bianca, alfa-tocoferolo, acido cloridrico, idrossianisolo butilato (E 320), sorbato di potassio (E 202).

Numero dell'omologazione



34370, 46898 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Fucidin? Quali confezioni sono disponibili?

Fucidin unguento e crema sono ottenibili in farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Unguento e crema: tubo da 15 g e da 30 g.

Titolare dell'omologazione

LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Kloten

Domicilio: Zurigo

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

