

## **Information destinée aux patients**

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## **Livostin® Spray nasal**

**JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH**

### **Qu'est-ce que le Livostin spray nasal et quand doit-il être utilisé?**

Livostin spray nasal est un médicament destiné au traitement des allergies nasales saisonnières. Son effet commence immédiatement et se poursuit pendant plusieurs heures. Livostin soulage rapidement les symptômes typiques de la rhinite allergique (par ex. le rhume des foins), tels qu'éternuements, démangeaisons nasales et écoulement nasal.

### **Quand Livostin spray nasal ne doit-il pas être utilisé?**

Livostin spray nasal ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants. Livostin spray nasal ne doit pas être utilisé en cas de troubles graves de la fonction rénale (insuffisance rénale).

En cas de doute, veuillez consulter votre médecin, pharmacien ou droguiste.

### **Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Livostin spray nasal?**

Si vous souffrez d'un trouble de la fonction rénale, vous devez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Ne pas utiliser Livostin spray nasal sans ordonnance médicale pendant plus de 2 semaines. Si les symptômes persistent après cette période, veuillez consulter votre médecin. Cette préparation peut être utilisée pendant plus de 2 semaines sur ordonnance médicale. Dans ce cas, elle ne doit pas être utilisée de façon régulière pendant plus de 2 mois.

Livostin spray nasal ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans.

En règle générale, Livostin spray nasal n'affecte pas l'attention et la concentration. En cas de somnolence, soyez prudent lors de la conduite d'un véhicule ou de l'utilisation de machines.

Ce médicament contient 0,015 mg de chlorure de benzalkonium par pulvérisation équivalent à 0,15 mg/ml.

#### **Suspension**

Le chlorure de benzalkonium peut provoquer des irritations ou un gonflement à l'intérieur du nez, surtout s'il est utilisé sur une longue période.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!)

### **Livostin spray nasal peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?**

Dans l'état actuel des connaissances, aucun risque pour l'enfant n'a été observé lors d'un usage du médicament conforme à sa destination. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Livostin spray nasal ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, sauf si le médecin le juge absolument indispensable. Cette remarque s'applique également à l'allaitement.

### **Comment utiliser Livostin spray nasal?**



Sauf indication contraire de votre médecin, Livostin spray nasal doit être utilisé de la manière suivante:

***Adultes et enfants de plus de 6 ans:***

2 pulvérisations dans chaque narine, 2 fois par jour.

L'utilisation et la sécurité de Livostin spray nasal chez les enfants de moins de 6 ans n'ont pas encore été évaluées.

***Utilisation***

Lors de la première utilisation, ôter le capuchon protecteur et appuyer plusieurs fois sur la tête de pulvérisation jusqu'à ce que l'on voie sortir un fin nuage de gouttelettes.

Bien se moucher et secouer le flacon avant chaque emploi. Introduire l'embout du spray nasal dans la narine. Se boucher l'autre narine, appuyer sur la tête de pulvérisation et inspirer par le nez en même temps. Répéter l'opération pour l'autre narine.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

***Quels effets secondaires Livostin spray nasal peut-il provoquer?***

*Très fréquents (affecte plus de 1 personne sur 10)*

- Céphalées

*Fréquents (affecte entre 1 à 10 personnes sur 100)*

- Inflammation des sinus
- Somnolence
- Fatigue
- Vertiges
- Nausées
- Douleurs au site d'administration
- Maux de gorge
- Saignements de nez
- Toux

*Occasionnels (affecte entre 1 à 10 personnes sur 1'000)*

- Hypersensibilité
- Palpitations
- Malaise général
- Difficultés respiratoires

*Occasionnels (affecte entre 1 à 10 personnes sur 1'000) à très rares (affecte moins de 1 personne sur 10'000)*

- Nez bouché
- Inconfort nasal
- Irritations, inconfort, douleurs, sensation de brûlure ou sécheresse au site d'administration

*Rares (affecte entre 1 à 10 personnes sur 10'000)*

- Palpitations



- Gonflement nasal

*Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)*

- Rétrécissement des voies respiratoires
- Réactions d'hypersensibilité allergiques
- Gonflement des paupières

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

### **À quoi faut-il encore faire attention?**

#### *Stabilité*

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Refermer le flacon aussitôt après utilisation.

#### *Remarques particulières concernant le stockage*

Stocker à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de la portée des enfants.

#### *Remarques concernant la manipulation*

Refermer le flacon aussitôt après utilisation.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

### **Que contient Livostin spray nasal?**

#### *Principes actifs*

1 ml de suspension pour pulvérisation nasale (micro-suspension) contient 0,5 mg de lévocabastine (sous forme de chlorhydrate de lévocabastine).

Une pulvérisation correspond à 0,1 ml et contient 0,05 mg de lévocabastine.

#### *Excipients*

Propylène glycol (E 1520), chlorure de benzalkonium, hydrogénophosphate de sodium monohydraté, dihydrogénophosphate de sodium monohydraté, polysorbate 80, hypromellose, édétate de sodium, eau purifiée

### **Numéro d'autorisation**

50497 (Swissmedic)

### **Où obtenez-vous Livostin spray nasal? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Suspension pour pulvérisation nasale 10 ml (équivalent à 86 pulvérisations minimum).

### **Titulaire de l'autorisation**

JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH, Risch, Domicile: Rotkreuz

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

