

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Livostin® Spray nasale

JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH

Che cos'è Livostin Spray nasale e quando si usa?

Livostin Spray nasale è un medicamento per il trattamento delle allergie stagionali del naso. Il suo effetto è immediato e dura parecchie ore. Livostin allevia rapidamente i segni tipici della rinite allergica (ad esempio, raffreddore da fieno) quali starnuti, prurito al naso e rinorrea.

Quando non si può usare Livostin Spray nasale?

In caso di ipersensibilità ad uno degli ingredienti di Livostin Spray nasale non deve essere usato. Livostin Spray nasale non può essere utilizzato in presenza di gravi disturbi della funzione renale (insufficienza renale).

In caso di dubbio chiedi al suo medico, farmacista o droghiere.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Livostin Spray nasale?

Se si soffre di disfunzione renale, avvisare il medico, il farmacista o il droghiere.

Non usare Livostin Spray nasale senza ricetta per più di 2 settimane. Se dopo questo tempo i sintomi persistono, consulti il medico. Su prescrizione medica, le settimane di assunzione del preparato possono essere prolungate a più di 2. In questo caso, l'uso regolare non deve superare i 2 mesi.

I bambini sotto i 6 anni non devono usare Livostin Spray nasale.

In generale Livostin Spray nasale non ha alcun impatto su attenzione e concentrazione. Nel caso di sonnolenza, si raccomanda prudenza quando si guidano veicoli o si usano macchine.

Questo medicamento contiene 0,015 mg di benزالconio cloruro per nebulizzazione corrispondente a 0,15 mg/ml di sospensione.

Il benزالconio cloruro può causare irritazione o gonfiore della mucosa nasale, soprattutto in caso di uso prolungato.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie
- assume o applica esternamente altri medicamenti (anche se acquistati di sua iniziativa!)

Si può usare Livostin Spray nasale durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, con la corretta applicazione non sussiste alcun rischio per il bambino. Tuttavia, non sono mai state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Livostin Spray nasale non deve essere usato in gravidanza, a meno che il medico non lo ritenga strettamente necessario. Lo stesso dicasi per l'allattamento.

Come usare Livostin Spray nasale?

Se non diversamente indicato dal medico curante applicare Livostin Spray nasale come segue:

Adulti e bambini sopra i 6 anni:

2 nebulizzazioni 2 volte al giorno per narice.



L'uso e la sicurezza di Livostin Spray nasale nei bambini sotto i 6 anni non sono finora non sono stati esaminati.

Modo di somministrazione

Quando si usa il preparato per la prima volta, occorre rimuovere il cappuccio di protezione e quindi premere ripetutamente il dispositivo nebulizzatore fino a farne uscire una nebbiolina finissima.

Prima di ogni utilizzo, soffiarsi accuratamente il naso e agitare il flaconcino. Introdurre nella narice lo spray nasale. Chiudere la narice libera e inspirare attraverso il naso quando si preme il beccuccio dell'erogatore. Ripetere per l'altra narice.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Livostin Spray nasale?

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

Mal di testa

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

- Infiammazione dei seni paranasali
- Sonnolenza
- Stanchezza
- Vertigini
- Nausea
- Dolore al sito di applicazione
- Mal di gola
- Epistassi
- Tosse

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1'000)

- Ipersensibilità
- Palpitazioni
- Malessere generale
- Difficoltà di respirazione

Da non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1'000) a molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10'000)

- Congestione nasale
- Disturbi nasali
- Irritazione, disagio, dolore, bruciore o secchezza al sito di applicazione

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000):

- Tachicardia
- Gonfiore nasale

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).:

- Costrizione delle vie aeree
- Reazioni allergiche di ipersensibilità



- Gonfiore della palpebra

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C)

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per la manipolazione

Richiudere il flaconcino immediatamente dopo l'uso.

Il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Livostin Spray nasale?

Principi attivi

1 ml di spray nasale, sospensione (microsospensione) contiene 0,5 mg di levocabastina (come cloridrato di levocabastina).

1 nebulizzazione corrisponde a 0,1 ml e contiene 0,5 mg di levocabastina.

Sostanze ausiliarie

Glicole propilenico (E 1520), benzalconio cloruro, sodio monoidrogeno fosfato, sodio diidrogeno fosfato monoidrato, polisorbato 80, ipromellosa, sodio edetato, acqua purificata

Numero dell'omologazione

50497 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Livostin Spray nasale? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Spray nasale, sospensione da 10 ml (minimo 86 nebulizzazioni).

Titolare dell'omologazione

JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH, Risch, Domicilio: Rotkreuz

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

