

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Metoprolol-Acino 25/50/100/200, compresse a rilascio prolungato

Che cos'è Metoprolol-Acino e quando si usa?

Metoprolol-Acino contiene come principio attivo metoprololo. Il metoprololo appartiene al gruppo dei betabloccanti e viene utilizzato nel trattamento della pressione sanguigna alta (ipertensione arteriosa), nel trattamento a lungo termine dell'angina pectoris (oppressione cardiaca), nella debolezza cardiaca cronica (insufficienza cardiaca cronica), nelle turbe del ritmo cardiaco e nelle turbe cardiocircolatorie con palpitazioni. Inoltre, può essere usato nella prevenzione dell'emicrania.

Grazie alla formulazione speciale che permette la liberazione controllata del principio attivo, l'effetto delle compresse a rilascio prolungato di Metoprolol-Acino dura normalmente 24 ore.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Su prescrizione medica.

Quando non si può assumere/usare Metoprolol-Acino?

Il Metoprolol-Acino non può essere assunto in caso di ipersensibilità nota nei confronti del principio attivo, il metoprololo, di una delle sostanze ausiliarie, o nei confronti di altri farmaci appartenenti al gruppo dei betabloccanti.

Metoprolol-Acino non può essere usato neppure in presenza di:

- disturbo nella conduzione dell'eccitazione dagli atri ai ventricoli cardiaci (blocco atrioventricolare di grado II e III),
- battito cardiaco irregolare, spesso fortemente rallentato e talvolta molto rapido (salvo in caso di pacemaker permanente),
- disturbo nella conduzione dell'eccitazione tra il nodo senoatriale e l'atrio,
- shock,
- insufficienza cardiaca accompagnata da accumulo di liquidi nei polmoni, irrorazione sanguigna ridotta o bassa pressione arteriosa,
- polso a riposo prima del trattamento inferiore a 50 battiti al minuto,
- pressione arteriosa eccessivamente bassa (ipotensione),
- irrorazione sanguigna nelle braccia o nelle gambe fortemente ridotta,
- predisposizione ad asma bronchiale o a spasmi bronchiali.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Metoprolol-Acino?

In caso di contemporaneo trattamento farmacologico di malattie del sistema respiratorio, le dosi delle diverse medicine devono essere regolate dal medico.

Si raccomanda attenzione in caso di diabete, di certe malattie del cuore, di disturbi della conduzione dello stimolo cardiaco e dell'irrorazione sanguigna, di funzione epatica ridotta ed in caso di pazienti affetti da un tumore che produce ormoni (feocromocitoma).



Prima di operazioni si deve avvisare l'anestesista del trattamento con Metoprolol-Acino.

Una serie di altri farmaci (comprese gocce per il naso e gli occhi) e anche l'alcool, se presi contemporaneamente, possono influenzare l'effetto di Metoprolol-Acino.

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine.

Metoprolol-Acino contiene saccarosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Metoprolol-Acino durante la gravidanza o l'allattamento?

In caso di gravidanza, se sta pianificando una gravidanza e durante l'allattamento, Metoprolol-Acino può essere assunto solo dopo aver consultato il medico.

Metoprolol-Acino è un betabloccante che può causare danni al feto o indurre un travaglio prematuro.

Come usare Metoprolol-Acino?

Le compresse a rilascio prolungato di Metoprolol-Acino vanno prese una volta al giorno con un bicchiere d'acqua. Il medicamento può essere assunto durante o lontano dai pasti. Le compresse a rilascio prolungato di Metoprolol-Acino hanno un solco centrale e si possono facilmente dividere, ma non si devono né masticare né schiacciare.

Sulla base di esami effettuati a intervalli regolari, il medico stabilirà la dose adatta a lei. In generale sono valide le seguenti direttive di dosaggio:

Pressione alta (ipertensione)

Adulti

In caso di ipertensione leggera o media, prendere 1 volta al giorno, alla mattina, 1 compressa a rilascio prolungato di Metoprolol-Acino 50. La dose può essere aumentata dal medico ad 1 compressa a rilascio prolungato di Metoprolol-Acino 100 oppure di Metoprolol-Acino 200. Se necessario, il medico prescriverà un farmaco supplementare contro l'ipertensione.

Bambini ed adolescenti (dai 6 ai 16 anni)

La posologia per i bambini dai 6 anni in poi dipende dal peso corporeo. Il medico stabilirà e controllerà la dose più corretta per il suo bambino.

Non è raccomandato l'uso di Metoprolol-Acino nei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Angina pectoris (oppressione cardiaca)

In caso di angina pectoris, prendere 1 volta al giorno 1 compressa a rilascio prolungato di Metoprolol-Acino 100 o Metoprolol-Acino 200. Se necessario, il dosaggio può essere ulteriormente aumentato dal medico.

Debolezza cardiaca cronica (insufficienza cardiaca cronica)

Trattamento iniziale dell'insufficienza cardiaca cronica: 1 compressa da 25 mg di Metoprolol-Acino 1 volta al giorno per 2 settimane.



In caso di insufficienza cardiaca di maggiore gravità, il medico può iniziare il trattamento con una dose più bassa, e cioè con 12,5 mg 1 volta al giorno (mezza compressa a rilascio prolungato da 25 mg di Metoprolol-Acino). Questa dose può successivamente essere raddoppiata ogni due settimane, fino a 200 mg di Metoprolol-Acino 1 volta al giorno.

Disturbi del ritmo cardiaco

In caso di disturbi del ritmo cardiaco, prendere 1 volta al giorno 1 compressa a rilascio prolungato di Metoprolol-Acino 100 o Metoprolol-Acino 200. Se necessario, il dosaggio può essere ulteriormente aumentato dal medico.

Disturbi della circolazione cardiaca con palpitazioni

In caso di disturbi della circolazione cardiaca, prendere 1 volta al giorno 1 compressa a rilascio prolungato di Metoprolol-Acino 100. Se necessario, il dosaggio può essere ulteriormente aumentato dal medico.

Profilassi dell'emicrania

Per la profilassi dell'emicrania, prendere 1 volta al giorno 1 compressa a rilascio prolungato di Metoprolol-Acino 100 o Metoprolol-Acino 200.

In nessun caso si deve interrompere improvvisamente l'uso di Metoprolol-Acino. Il medico stabilisce l'opportuna riduzione graduale della dose.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Metoprolol-Acino?

Con l'assunzione di Metoprolol-Acino possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

Stanchezza

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Vertigini, mal di testa, nausea, mal di pancia, difficoltà a respirare, polso notevolmente lento, mani e piedi freddi, diarrea e costipazione

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Stati d'esaurimento, vomito, dolori nella regione del cuore, edemi (accumulo d'acqua nei tessuti), crampi muscolari, sonnolenza, insonnia, incubi, diminuzione dell'attenzione, depressioni, aumento della sudorazione, eruzioni sulla pelle, crisi d'asma e aumento di peso.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Palpitazioni, battito cardiaco irregolare, debolezza di cuore (insufficienza cardiaca), nervosismo, stati ansiosi, disturbi della vista, occhi secchi e irritati, infiammazione della mucosa nasale, debolezza muscolare, secchezza della bocca, caduta dei capelli, disturbi della libido e della potenza sessuale.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10'000)

Oscillazioni dell'umore, disturbi della memoria, confusione, allucinazioni, ronzio nelle orecchie, modificazioni del gusto, aumentata sensibilità della pelle alla luce, aggravamento della psoriasi e dolori articolari.



Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Le compresse scadute devono essere riportate in farmacia per l'eliminazione.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Metoprolol-Acino?

Principi attivi

1 compressa a rilascio prolungato di Metoprolol-Acino 25, 50, 100 o 200 contiene, rispettivamente, 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg o 190 mg di metoprololo succinato (equivalenti, rispettivamente, a 25 mg, 50 mg, 100 mg o 200 mg di metoprololo tartrato).

Sostanze ausiliarie

Sfere di amido di zucchero (contengono saccarosio e amido di mais), macrogol, dispersione di poliacrilato 30%, talco, povidone, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, acido silicico, silice colloidale anidra, ipromellosa, titanio diossido (E 171).

Numero dell'omologazione

59206 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Metoprolol-Acino? Quali confezioni sono disponibili?

Metoprolol-Acino è disponibile in farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 30, 50 e 100 compresse a rilascio prolungato (Metoprolol-Acino 25, Metoprolol-Acino 50, Metoprolol-Acino 100 e Metoprolol-Acino 200), con linea di frattura, divisibili.

Titolare dell'omologazione

Acino Pharma AG, Liesberg.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

