

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte das Arzneimittel ihnen schaden. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Ruberkehl® D5, Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Ruberkehl® D5, Tropfen angewendet?

Gemäß homöopathischem Arzneimittelbild kann Ruberkehl® D5, Tropfen auf Verschreibung Ihres Arztes oder Ihrer Ärztin bei allergischen Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege wie Fließschnupfen, Sinusitis und Bronchitis angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Ruberkehl® D5, Tropfen gleichzeitig angewendet werden darf.

Wann darf Ruberkehl® D5, Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Bei bekannter Allergie auf *Aspergillus ruber* sollte Ruberkehl® D5, Tropfen nicht angewendet werden. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht anwenden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äußerlich anwenden.

Darf Ruberkehl® D5, Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemäßer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Ruberkehl® D5, Tropfen?

Dosierung / Anwendung:

Zum Einnehmen: Erwachsene 1 mal täglich 8 Tropfen vor einer Mahlzeit.

Zum Einreiben in die Haut: Erwachsene 1 mal täglich 5-10 Tropfen am Ort der Erkrankung oder in der Ellenbeuge.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Die Anwendung und Sicherheit von Ruberkehl D5, Tropfen bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wurde bisher nicht geprüft. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer



Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Ruberkehl® D5, Tropfen haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme oder Anwendung von Ruberkehl® D5, Tropfen auftreten: Bei allergischen Patienten können gelegentlich Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z.B. Hautrötungen, auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Ruberkehl® D5, Tropfen ab und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit „verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin.

Was ist in Ruberkehl® D5, Tropfen enthalten?

1 mL Lösung enthält:

1 mL Aspergillus ruber D5 aquos dil. (HAB, 5a).

Zulassungsnummer

55244 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Ruberkehl® D5, Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Packung zu 10 mL.

ZulassungsinhaberIn

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Diese Packungsbeilage wurde im Dezember 2006 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

