

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Ruberkehl® D5, gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Ruberkehl® D5, gocce ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Ruberkehl® D5, gocce può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di malattie allergiche delle vie respiratorie superiori ed inferiori come raffreddore di polline, sinusite o bronchite.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se contemporaneamente può usare Ruberkehl® D5, gocce.

Quando non si può usare Ruberkehl® D5, gocce e quando il suo uso richiede prudenza?

Ruberkehl® D5, gocce non può essere usato in caso di allergia conosciuta a *Aspergillus ruber*. Non deve essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.

Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Ruberkehl® D5, gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Ruberkehl® D5, gocce?

Posologia / uso negli adulti:

Da prendere: una volta al giorno 8 gocce prima di un pasto.

Da frizionare: una volta al giorno 5-10 gocce sulla zona colpita o al di sopra del gomito.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. L'uso e la sicurezza dell'Ruberkehl® D5, gocce nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Ruberkehl® D5, gocce?



In seguito all' uso di Ruberkehl® D5, gocce possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: Reazioni ipersensibili come arrossamenti della pelle possono talvolta apparire nei pazienti allergici. Se osserva effetti collaterali non menzionati, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l' assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Ruberkehl® D5, gocce e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni

Cosa contiene Ruberkehl® D5, gocce?

1 mL di soluzione contiene:

1 mL Aspergillus ruber D5 aquos. dil. (HAB, 5a)

Numero dell'omologazione

55244 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Ruberkehl® D5, gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 10 mL.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

