

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Prostatonin® capsule

Max Zeller Söhne AG

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Prostatonin e quando si usa?

Prostatonin è un preparato di combinazione utilizzato in caso di disturbi della minzione dovuti ad un aumento di volume della prostata (iperplasia prostatica).

Il preparato contiene estratti ricavati dalla corteccia del *Pygeum africanum* e dalle radici dell'ortica (*Urtica*). Il risultato del suo impiego è una minzione ad intervalli più lunghi e in quantità maggiore e quindi un riposo notturno ininterrotto.

Prostatonin serve ad attenuare i disturbi che compaiono nella fase iniziale di una iperplasia prostatica (ingrossamento della prostata) con tenesmo vescicale o disturbi dello svuotamento della vescica (perdita di urina a gocce, getto debole).

Di che cosa occorre inoltre tenere conto durante il trattamento?

Questo medicamento attenua solo i disturbi presenti in caso di aumento di volume della prostata senza tuttavia eliminare l'ingrossamento della stessa. È quindi necessario consultare il proprio medico curante ad intervalli regolari.

Prostatonin contiene glucosio (0.25 g di carboidrati per capsula, corrispondente a 0.02 UP).

Quando non si può usare Prostatonin e quando il suo uso richiede prudenza?

Finora non sono note limitazioni d'uso.

Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Come usare Prostatonin?

Adulti

Se non diversamente prescritto, prendere 1 capsula 2 volte al giorno, dopo i pasti, con un po' di liquido senza masticare.

In generale il trattamento dovrebbe protrarsi per almeno 8 settimane.

Siccome un aumento di volume della prostata non si presenta nei bambini e negli adolescenti, l'utilizzo del prodotto è limitato agli adulti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Prostatonin?



In seguito all'assunzione di Prostatonin possono essere osservati i seguenti effetti collaterali:
Eventuale comparsa di disturbi gastrici soprattutto all'inizio del trattamento (eruttamenti).
Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Prostatonin deve essere conservata in un luogo asciutto, a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Prostatonin?

Una capsula contiene:

Estratto di prugna africana (*Pygeum africanum*) PY102 25 mg, rapporto droga-estratto: 180 – 200: 1, solvente di estrazione: cloruro di metilene

Estratto standardizzato di radici dell'ortica (*Urtica*) UR102 300 mg, rapporto droga-estratto: 7 – 14: 1, solvente di estrazione: metanolo 30%

Questo preparato contiene inoltre sostanze ausiliarie.

Numero dell'omologazione

67557 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Prostatonin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogherie senza prescrizione medica.

Confezioni da 60 capsule.

Titolare dell'omologazione

Max Zeller Söhne AG, CH-8590 Romanshorn.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2012 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

