

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Sanuvis®, solution injectable

Médicament homéopathique

Quand Sanuvis®, solution injectable est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Sanuvis®, solution injectable peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas de fatigue musculaire et insuffisance cardiaque.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Sanuvis®, solution injectable peut être utilisé simultanément.

Quand Sanuvis®, solution injectable ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Les expériences documentées sur l'utilisation de Sanuvis, solution injectable chez les enfants et les adolescents sont insuffisantes. L'utilisation n'est donc pas recommandée chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- si vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Sanuvis®, solution injectable peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Sanuvis®, solution injectable?

Sauf prescription médicale contraire, les adultes prennent : injecter 1-3 fois par semaine 1 ampoule à 2 ml par voie intramusculaire. L'utilisation et la sécurité de Sanuvis, solution injectable ne sont pas encore étudiées chez les enfants et les adolescents.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Sanuvis®, solution injectable peut-il provoquer?



Aucun effet secondaire de Sanuvis®, solution injectable n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Sanuvis®, solution injectable et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « à utiliser jusqu'au » sur le récipient. Garder le médicament hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Sanuvis®, solution injectable?

1 ampoule à 2 ml contient:

0,4ml Acidum L(+)-lacticum D4 aquos,

0,4ml Acidum L(+)-lacticum D6 aquos,

0,4ml Acidum L(+)-lacticum D12 aquos,

0,4ml Acidum L(+)-lacticum D30 aquos,

0,4ml Acidum L(+)-lacticum D200 aquos,

(HAB; 5b, 11).

Cette préparation contient en outre du chlorure de sodium comme excipient.

Numéro d'autorisation

50368 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Sanuvis®, solution injectable? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 10 x 2 ml ou 50 x 2 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2004 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

