

Informations à l'attention des patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez des informations importantes.
Ce médicament vous a été prescrit personnellement par votre médecin ou vous l'avez obtenu sans prescription médicale à la pharmacie ou la droguerie. Utilisez ce médicament conformément à la notice d'emballage ou aux instructions du médecin, du pharmacien ou du droguiste pour pouvoir en tirer le meilleur profit. Conservez précieusement la notice d'emballage pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Adler Allergie comprimés

Médicament biochimique selon le Dr Schüssler

Quand *Adler Allergie comprimés* est-il utilisé?

Conformément au principe thérapeutique selon le Dr Schüssler, *Adler Allergie comprimés*, peut être utilisé pour atténuer les symptômes allergiques aigus tels que rhinite, éternuements, irritations de la conjonctive, urticaire, démangeaisons ainsi que les problèmes allergiques chroniques.

L'utilisation de ce médicament dans les indications citées repose exclusivement sur les principes de la biochimie selon le Dr Schüssler.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou votre pharmacien si *Adler Allergie comprimés* peut être pris en même temps.

En cas de détérioration de votre état, consultez rapidement votre médecin.

Remarque à l'attention des diabétiques : 1 comprimé contient 0,25 g de glucides assimilables par dose unitaire.

Ce médicament ne permet pas de traiter des carences importantes (par ex. en fer, zinc).

Quand *Adler Allergie comprimés* ne doit-il pas être pris/utilisé ou seulement avec précaution ?

Adler Allergie comprimés ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 3 ans. 1 comprimé contient 250 mg de lactose. Ne prenez *Adler Allergie comprimés* qu'après avoir pris l'avis de votre médecin si vous savez que vous souffrez d'une intolérance au sucre.

Aucune autre restriction d'utilisation n'est connue à ce jour. Aucune précaution particulière n'est requise en cas d'utilisation conforme.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous

- souffrez d'autres pathologies
- souffrez d'allergies ou
- prenez d'autres médicaments (même en automédication).



Peut-on prendre/utiliser *Adler Allergie comprimés* pendant une grossesse ou pendant l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Mais il n'a toutefois jamais été procédé à des études scientifiques systématiques. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, pharmacien ou droguiste.

Comment utiliser *Adler Allergie comprimés* ?

Sauf prescription contraire du médecin :

La dose recommandée est de	Symptômes aigus	Symptômes chroniques
	1 semaine maximum	4 semaines maximum
Enfants à partir de 3 ans, adolescents et adultes	1 comprimé toutes les 10 minutes	1 comprimé toutes les 30 minutes

Ne pas prendre plus de 80 comprimés par jour.

Diminuer la fréquence des prises en cas d'amélioration des troubles.

Faire fondre *Adler Allergie comprimés* dans la bouche.

Adler Allergie comprimés peut être pris juste avant le repas et 15 minutes après le repas.

Durée de l'utilisation

Si les troubles s'aggravent ou si aucune amélioration n'est constatée après 3 jours en cas de troubles aigus, ou après 4 semaines en cas de troubles chroniques, il est conseillé de consulter un médecin.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 3 ans.

Respectez la posologie figurant sur la notice d'emballage ou prescrite par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Si vous pensez que l'efficacité de votre médicament est trop faible ou au contraire trop forte, adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires *Adler Allergie comprimés* peut-il provoquer ?

Chez les personnes souffrant d'intolérance au lactose, la prise de ce médicament peut provoquer des troubles gastro-intestinaux ou avoir un effet laxatif. Si vous constatez des effets secondaires, adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste. Ceci s'applique notamment aussi aux effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans la présente notice.



Pour *Adler Allergie comprimés*, aucun effet secondaire n'a été constaté à ce jour en cas d'utilisation conforme. Si vous observez néanmoins des effets secondaires, informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur la boîte. Le lactose absorbe facilement les odeurs de son environnement. Il convient donc de conserver les comprimés dans une boîte fermée et dans un endroit sans odeur.

Lagerungshinweis

À conserver dans l'emballage d'origine et à température ambiante (15-25 °C).
Tenir hors de portée des enfants.

Autres informations

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient *Adler Allergie comprimés* ?

1 comprimé de 260 mg contient :

Wirkstoffe

Nr.2 Calcium phosphoricum (HAB) D6 (HAB 6) 20mg, Nr.3 Ferrum phosphoricum (HAB) D12 (HAB 6) 35mg, Nr.4 Kalium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 35mg, Nr.8 Natrium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 70mg, Nr.10 Natrium sulfuricum (HAB) D6 (HAB 6) 40mg, Nr.21 Zincum chloratum (Zinci chloridum Ph.Eur.) D12 (HAB 6) 20mg et Nr.24 Arsenum jodatum (HAB) D12 (HAB 6) 30mg.

Excipients

250 mg lactose, fécule de pomme de terre et béhénate de calcium

Numéro d'autorisation

67523 (Swissmedic)

Où obtenez-vous obtenir *Adler Allergie comprimés* ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Chez votre pharmacien ou votre droguiste, sans prescription médicale.
Boîtes de 400 et 1000 comprimés.

Titulaire de l'autorisation



Adler Pharma Helvetia AG

Dorfplatz 10

CH-6060 **Sarnen**

Suisse

Fabricant

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH

Brucker Bundesstrasse 25A

A-5700 Zell am See

Autriche

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

