

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo perché contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o lo ha ricevuto senza prescrizione medica in farmacia. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo seguendo le indicazioni del medico o del farmacista. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Adler Allergie Compresse

Medicamento biochimico del Dr. Schüssler

Quando si usa *Adler Allergie Compresse*?

Secondo il principio della terapia biochimica del Dr. Schüssler, *Adler Allergie, Compresse* può essere utilizzato per alleviare i sintomi allergici acuti come rinorrea, starnuti, irritazioni della congiuntiva, orticaria, prurito e per alleviare i sintomi da allergia cronica.

L'impiego di questo medicamento nel campo di applicazione indicato si basa esclusivamente sui principi della biochimica del Dr. Schüssler.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi *Adler Allergie, Compresse*.

Se le condizioni peggiorano consultare immediatamente il medico.

Nota per i pazienti diabetici: 1 compressa contiene 0,25 g di carboidrati utilizzabili per singola dose.

Questo medicamento non può essere utilizzato per il trattamento di carenze di sostanze minerali (ad es. ferro, zinco).

Quando non si può assumere *Adler Allergie Compresse* e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non utilizzare *Adler Allergie, Compresse* nei bambini di età inferiore ai 3 anni. 1 compressa contiene 250 mg di lattosio. Se sa di avere una intolleranza allo zucchero, assuma *Adler Allergie, Compresse* solo dopo aver consultato il medico.

Ad oggi non sono note ulteriori restrizioni d'uso. Se il medicamento è usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di propria iniziativa!).



Si può assumere **Adler Allergie Compresse** durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare **Adler Allergie Compresse**?

Salvo diversa prescrizione medica:

La dose raccomandata è	Sintomi acuti	Sintomi cronici
	Max. per 1 settimana	Max. per 4 settimane
Bambini sopra i 3 anni, adolescenti e adulti	1 compressa ogni 10 minuti	1 compressa ogni 30 minuti

Non assumere più di 80 compresse al giorno

Ridurre la frequenza di somministrazione in caso di miglioramento dei disturbi.

Lasciar sciogliere *Adler Allergie Compresse* in bocca.

Adler Allergie Compresse può essere assunto fino a subito prima dei pasti e a partire da 15 minuti dopo aver mangiato.

Durata dell'utilizzo

Se i sintomi peggiorano o se i sintomi acuti persistono dopo 3 giorni, o se i sintomi cronici non migliorano dopo 4 settimane, consultare il medico.

Non somministrare ai bambini sotto i 3 anni

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, farlo visitare da un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere **Adler Allergie Compresse**?

Per le persone affette da intolleranza al lattosio, l'assunzione del medicamento può portare a disturbi gastrointestinali o avere un effetto lassativo. Se nota degli effetti collaterali consulti il suo medico o il suo farmacista, in particolare se nota degli effetti collaterali che non sono indicati in questo foglietto illustrativo.



Se il medicamento è usato correttamente, per *Adler Allergie, Compresse* finora non sono stati osservati effetti collaterali. Tuttavia, se nota degli effetti collaterali informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento può essere assunto solo fino alla data indicata con «da consumare entro il» sulla confezione.

Il lattosio assorbe facilmente gli odori dell'ambiente circostante, pertanto conservare sempre le compresse nella scatola chiusa e in un luogo privo di odori.

Lagerungshinweis

Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente (15-25°C).

Mantenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Per ulteriori informazioni si rivolga al suo medico o al suo farmacista.

Che cosa contiene *Adler Allergie Compresse*?

1 compressa da 260 mg contiene:

Wirkstoffe

N. 2 Calcium phosphoricum (HAB) D6 (HAB 6) 20 mg, N. 3 Ferrum phosphoricum (HAB) D12 (HAB 6) 35 mg, N. 4 Kalium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 35 mg, N. 8 Natrium chloratum (HAB) D6 (HAB 6) 70 mg, N. 10 Natrium sulfuricum (HAB) D6 (HAB 6) 40 mg, N. 21 Zincum chloratum (Zinci chloridum Ph.Eur.) D12 (HAB 6) 20 mg e N. 24 Arsenum jodatum (HAB) D12 (HAB 6) 30 mg.

Eccipienti

250 mg lattosio, fecola di patate e beenato di calcio

Numero dell'omologazione

67523 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *Adler Allergie Compresse*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia senza prescrizione medica.

Confezioni da 400 e 1000 compresse.

Titolare dell'omologazione

Adler Pharma Helvetia AG

Dorfplatz 10



CH-6060 **Sarnen**

Svizzera

Fabbricante

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH

Brucker Bundesstrasse 25A

A-5700 Zell am See

Austria

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

