

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Drossadin®

Drossapharm AG

Che cos'è Drossadin e quando si usa?

Drossadin è un antisettico orofaringeo e agisce contro batteri e funghi che possono causare infezioni nel cavo orale e nella faringe. Drossadin possiede proprietà emostatiche (antiemorragiche), antidolorifiche e che favoriscono la guarigione ed è inoltre ben tollerato sulle mucose.

Il principio attivo esetidina contenuto in Drossadin è caratterizzato da una forte aderenza alla superficie delle mucose, per cui in molti casi, anche dopo 10 - 12 ore, è ancora dimostrabile un'attività antibatterica.

Drossadin viene impiegato nelle malattie infiammatorie acute del cavo orofaringeo e per l'igiene orale in caso di:

- infiammazione delle tonsille
- come terapia aggiuntiva in caso di angina
- infiammazione della laringe (laringite) e della mucosa faringea
- prima e dopo l'asportazione chirurgica delle tonsille
- infiammazione della mucosa orale
- afte
- infiammazione della lingua e delle gengive
- sanguinamento gengivale
- infiammazione degli alveoli dentali
- mugghetto
- alito cattivo
- lesioni del cavo orofaringeo

Quando non si può usare Drossadin?

In caso di ipersensibilità a uno dei componenti.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Drossadin?

Drossadin 0.1% e 0.2%, soluzione e 0.2%, spray non devono essere ingeriti e contengono 4,8% vol. di etanolo (alcool). In ogni applicazione sono quindi contenuti 568 mg (Drossadin 0.1% e 0.2%, soluzione) e 40 mg (Drossadin 0.2%, spray) di etanolo (alcool). Può causare sensazione di bruciore sulla cute lesa.

Se usato correttamente non è necessario osservare particolari precauzioni.

In caso di febbre alta o se dopo una settimana non intervengono miglioramenti, consultare un medico.



L'uso prolungato per più di due settimane è consentito solo dopo averne parlato con il medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie o
- assuma altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applichi esternamente.

Si può usare Drossadin durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Drossadin?

Drossadin 0.1% e 0.2%, soluzione:

Adulti a partire da 18 anni:

Drossadin soluzione deve essere utilizzata pura (non diluita) due volte al giorno (mattina e sera) dopo i pasti. Non superare la dose giornaliera raccomandata senza prescrizione medica. Per le malattie del cavo orale sciacquare la bocca con 15 ml di Drossadin per mezzo minuto; per le infiammazioni del cavo faringeo fare gargarismi per lo stesso tempo, quindi sputare la soluzione.

La rispettiva dose va misurata con il misurino graduato in dotazione. Dopo l'uso e prima dell'uso da parte di un'altra persona, sciacquare il misurino con acqua e asciugarlo.

Per la terapia locale nel cavo orofaringeo Drossadin va applicato con un tampone in modo mirato sulle zone interessate.

In casi gravi trova indicazione la concentrazione di Drossadin soluzione allo 0.2%, che viene usata come la soluzione allo 0.1%, salvo diversa prescrizione medica.


Bambini e adolescenti:

L'uso e la sicurezza di Drossadin soluzione nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Drossadin 0.2%, spray

Adulti a partire da 18 anni:

Con Drossadin 0.2%, spray le zone interessate possono essere trattate localmente in modo mirato. Lo spray va utilizzato in posizione verticale e spruzzato nel cavo orofaringeo due volte al giorno (mattina e sera) dopo i pasti. Non superare la dose giornaliera raccomandata senza prescrizione medica. 5-10 spruzzi rappresentano una dose efficace. La quantità di Drossadin in eccesso va sputata. Si consiglia l'utilizzo dopo i pasti; il cavo orofaringeo non va sciacquato con acqua dopo l'utilizzo.



Per l'utilizzo ruotare l'adattatore spray lateralmente in posizione orizzontale e tenere lo spray in verticale durante l'uso. Prima di utilizzare lo spray per la prima volta, premere 5 volte la pompetta nebulizzatrice fino ad ottenere una nebulizzazione uniforme.

Dopo l'utilizzo e per chiuderlo, ruotare di nuovo l'adattatore spray portandolo in posizione verticale.

Bambini e adolescenti:

L'uso e la sicurezza di Drossadin spray nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Drossadin?

Con l'uso di Drossadin possono verificarsi i seguenti effetti collaterali:

Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10'000):

Reazioni nel sito di applicazione, irritazione della mucosa orale e faringea, infiammazione, formazione di vescicole e ulcere, formicolio o senso di intorpidimento nella bocca. Secchezza delle fauci, disturbi della deglutizione, nausea, ingrossamento delle ghiandole salivari e vomito. Reazioni allergiche della pelle (quali gonfiore del viso, angioedema) e delle vie respiratorie (tosse, affanno), in particolare nei pazienti con asma e orticaria cronica. Alterazioni del gusto (si tratta tuttavia di un disturbo trascurabile che scompare completamente).

Con l'uso regolare può comparire una colorazione dei denti e/o della lingua che può essere rimossa con una pulizia intensiva di denti e lingua.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Drossadin spray: dopo l'apertura, consumare entro 6 mesi.

Istruzioni di conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15°C-25°C).

Conservare il contenitore nella scatola originale per proteggere il contenuto dalla luce.

Cosa contiene Drossadin?

1 ml di Drossadin 0.1%, soluzione per uso nel cavo orale contiene:

Principio attivo:

1,0 mg di esetidina



Sostanze ausiliarie:

Etanolo, polisorbato 80, acido citrico monoidrato, menta essenza parzialmente dementolizzata, levomentolo, eucalipto essenza, acesulfame potassico, sodio idrossido. Sacarina sodica, neoesperidina DC, giallo chinolina (E 104), blu patentato (E 131), acqua purificata. Contiene 4,8% v/v di alcool.

1 ml di Drossadin 0.2%, soluzione e spray per uso nel cavo orale, soluzione contengono:

Principio attivo:

2,0 mg di esetidina

Sostanze ausiliarie:

Etanolo, polisorbato 80, acido citrico monoidrato, menta essenza parzialmente dementolizzata, levomentolo, eucalipto essenza, acesulfame potassico, sacarina sodica, sodio idrossido, giallo tramonto S (E110), neoesperidina DC, acqua purificata. Contiene 4,8% v/v di alcool.

Numero dell'omologazione

39798 (Swissmedic)

65701 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Drossadin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Drossadin 0.1%, soluzione (colore verde): flacone da 200 ml con misurino graduato

Drossadin 0.2%, soluzione (colore arancione): flacone da 200 ml con misurino graduato

Drossadin 0.2%, spray (colore arancione): flacone da 50 ml

Titolare dell'omologazione

Drossapharm AG, Basilea

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel **settembre 2021** dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

