

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Euthyrox®

Merck (Schweiz) AG

Che cos'è Euthyrox e quando si usa?

Euthyrox contiene un ormone tiroideo sintetico, la levotiroxina, esattamente identico all'ormone secreto dalla tiroide. Euthyrox viene utilizzato in diverse forme di ipotiroidismo ad integrazione dell'ormone mancante. In caso di ipertiroidismo, Euthyrox può essere assunto in associazione a un medicamento per la soppressione della funzionalità tiroidea (tireostatico) per garantire uno stato metabolico più stabile. Inoltre, Euthyrox serve alla soppressione di una nuova crescita tumorale e ad integrazione dell'ormone tiroideo mancante soprattutto dopo asportazione chirurgica di tumori maligni (malignomi) della tiroide. Euthyrox viene anche impiegato per testare la funzionalità tiroidea nonché nella profilassi di recidive dopo strumectomia o per il trattamento di un gozzo benigno.

I sintomi spesso presenti in caso di ridotta funzionalità tiroidea come apatia, calo del rendimento, stanchezza, sensazione di freddo, modificazioni della pelle e dei capelli o stitichezza scompaiono con il trattamento a base di Euthyrox.

Il medicamento può essere assunto solo su prescrizione medica.

Quando non si può assumere / usare Euthyrox?

In caso di iperfunzione tiroidea. Eccezione: come terapia di supporto nell'assunzione di un medicamento per l'inibizione dell'iperfunzione tiroidea (dopo normalizzazione del metabolismo).

Euthyrox non può essere assunto in caso di ipersensibilità nota alla levotiroxina o a una delle sostanze ausiliarie secondo la composizione.

Euthyrox non può essere assunto neppure in presenza di infarto miocardico acuto, dolori e sensazione di oppressione al petto (angina pectoris), insufficienza cardiaca con frequenza cardiaca accelerata, miocardite o endocardite/pericardite acute nonché in presenza di disturbi non trattati della funzione della corteccia delle ghiandole surrenali o dell'ipofisi. Nell'iperfunzione tiroidea in gravidanza, Euthyrox non va assunto in associazione con un medicamento per l'inibizione dell'iperfunzione tiroidea (tireostatico).

Euthyrox non deve essere assunto per perdere peso. Nei pazienti con funzione tiroidea normale, Euthyrox non ha un effetto dimagrante. Dosi più elevate possono causare effetti collaterali seri o anche potenzialmente fatali.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione / nell'uso di Euthyrox?

Informi assolutamente il medico se soffre di altre malattie.

Se dovesse osservare dei sintomi come vomito, malessere, febbre, intolleranza al caldo o caduta dei capelli, si rivolga al suo medico.

I seguenti medicinali possono modificare l'azione di Euthyrox

Antiepilettici (p.es. carbamazepina, fenitoina, barbiturici), antibiotici (p.es. rifampicina), medicinali per il trattamento di malattie psichiche (come preparati a base di litio, hypericum perforatum), medicinali per il trattamento delle aritmie cardiache, analgesici, diuretici, anticoagulanti, anti-HIV (del gruppo degli inibitori delle proteasi), medicinali antitumorali (del gruppo degli inibitori della tirosin chinasi).

L'uso concomitante di inibitori della pompa protonica (antiacidi) può ridurre l'effetto di Euthyrox. Il suo medico dovrà eventualmente modificare la posologia di Euthyrox.



L'assunzione contemporanea di orlistat (un medicamento utilizzato per perdere peso) può ridurre l'effetto di Euthyrox. Il suo medico dovrà eventualmente modificare la posologia di Euthyrox.

La colestiramina o il colestipolo contro l'ipercolesterolemia (antilipidici) possono inibire l'assorbimento intestinale di Euthyrox e pertanto devono essere assunti 4-5 ore dopo l'Euthyrox.

I medicinali a base di alluminio e di calcio contro l'acidità e il bruciore di stomaco e i preparati orali a base di ferro possono inibire l'assorbimento intestinale di Euthyrox e pertanto devono essere assunti almeno 2 ore dopo l'Euthyrox.

Se assume per la prima volta preparati a base di estrogeni (la 'pillola' o la terapia ormonale sostitutiva dopo la menopausa) o cambia medicamento, ne informi il medico poiché il dosaggio di Euthyrox deve essere eventualmente adeguato.

Se sta per sottoporsi a un'analisi di laboratorio per il controllo dei livelli di ormone tiroideo, deve informare il suo medico e/o il personale di laboratorio che sta assumendo o ha recentemente assunto biotina (nota anche come vitamina H, vitamina B7 o vitamina B8). La biotina può interferire con i risultati delle analisi di laboratorio. A seconda del tipo di analisi, i valori possono essere falsamente elevati o falsamente ridotti a causa della biotina. Il suo medico potrebbe chiederle di interrompere l'assunzione di biotina prima di sottoporsi alle analisi di laboratorio. Ricordi inoltre che anche altri prodotti che potrebbe assumere, ad es. preparati multivitaminici o integratori alimentari per i capelli, la pelle e le unghie, possono contenere biotina. Questa circostanza può influire sui risultati delle analisi di laboratorio. Informi il suo medico e/o il personale di laboratorio se assume medicinali o prodotti di questo tipo.

Euthyrox può modificare l'azione dei seguenti medicinali

Medicamenti per il miglioramento della prestazione cardiaca (glicosidi cardiaci), stimolanti della circolazione, antidepressivi triciclici.

Ipoglicemizzanti (antidiabetici): è necessario un monitoraggio regolare della glicemia. In determinate circostanze, il medico provvederà ad adeguare il dosaggio dei medicinali ipoglicemizzanti.

Anticoagulanti: è necessario un controllo regolare della coagulazione del sangue.

Interazione con prodotti alimentari

I prodotti a base di soia possono ridurre l'assorbimento di Euthyrox. Parli con il medico se consuma abitualmente prodotti a base di soia.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere / usare Euthyrox durante la gravidanza o l'allattamento?

Continuare ad assumere Euthyrox senza interruzione durante la gravidanza e l'allattamento. Il suo medico stabilirà la dose di Euthyrox che deve assumere durante la gravidanza o l'allattamento. Informi il suo medico se sta pianificando una gravidanza, è in gravidanza o sta allattando.

Come usare Euthyrox?

Schema posologico generale

La dose giornaliera complessiva deve essere assunta al mattino, a digiuno, senza masticare e con un po' di liquido, almeno mezz'ora prima della prima colazione. In caso di necessità le compresse possono essere dimezzate.

La dose giornaliera necessaria varia da individuo a individuo e viene stabilita dal medico in base a esami clinici e di laboratorio.

Posologia consigliata

Adulti ed adolescenti con più di 12 anni



Generalmente, la dose iniziale per gli adulti e gli adolescenti con più di 12 anni è di 25-50 µg al giorno. La dose giornaliera può essere aumentata, secondo il parere del medico, di 25-50 µg rispettivamente ad intervalli di 2-4 settimane fino a normalizzazione del metabolismo. Generalmente, la dose di mantenimento è di 100-200 µg al giorno.

Nei pazienti anziani, nei pazienti con malattie cardiache, con diminuzione della funzione della tiroide di lunga durata o particolarmente grave, e in quelli con altri disturbi del metabolismo, la dose iniziale sarà inferiore.

Bambini

Nei bambini il dosaggio viene stabilito in base al peso corporeo.

Ai lattanti la dose giornaliera complessiva va somministrata almeno mezz'ora prima del primo pasto della giornata. A tal fine, le compresse devono essere sciolte in un po' d'acqua e la soluzione lattiginosa così ottenuta va somministrata immediatamente aggiungendovi un po' d'acqua supplementare.

Si attenga scrupolosamente al dosaggio prescritto dal medico. Se ha erroneamente dimenticato l'assunzione di Euthyrox per un giorno, assuma il giorno dopo solo la dose prevista per quel giorno. Perché il trattamento sia efficace, il medicamento deve essere assunto regolarmente. Qualora nonostante l'assunzione delle compresse per più settimane siano ancora presenti i disturbi relativi alla carenza dell'ormone tiroideo, consultare il medico che deciderà eventualmente di aumentare il dosaggio.

In caso di interruzione o sospensione precoce del trattamento possono ricomparire i sintomi della malattia, il cui tipo dipende dalla malattia di base.

Durata del trattamento

Il trattamento con Euthyrox a seguito di ipotiroidismo o di intervento di tumore maligno alla tiroide è previsto per tutta la vita, in caso di gozzo benigno e di profilassi di recidive esso si protrae per alcuni mesi o alcuni anni. In caso di ipertiroidismo, Euthyrox viene assunto per la stessa durata del medicamento per ridurre la funzione della tiroide. Test della funzionalità tiroidea: assunzione per 14-28 giorni fino all'esecuzione della scintigrafia.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Euthyrox?

Si possono manifestare reazioni allergiche quali gonfiore del viso o del collo (angioedema), perdita di peso, disturbi psichici con perdita del rapporto con la realtà, tremore, insonnia, irrequietezza interiore, cefalea, crampi, tachicardia (accelerazione del battito cardiaco), aritmia cardiaca, dolori nella gabbia toracica (angina pectoris), diarrea, sudorazione eccessiva. In questi casi consultare un medico.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, informi anche il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per la conservazione

Non conservare a temperature superiori a 25°C.

Conservare il contenitore nella scatola originale per proteggere il contenuto dalla luce.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il suo medico e il suo farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Euthyrox?

Principi attivi



1 compressa contiene 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 o 200 µg di levotiroxina sodica anidra come levotiroxina sodica.

Sostanze ausiliarie

Mannitolo, amido di mais, gelatina, croscarmellosa sodica, acido citrico, magnesio stearato

Numero dell'omologazione

54949 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Euthyrox? Quali confezioni sono disponibili?

Euthyrox si acquista in farmacia solo dietro presentazione della prescrizione medica.

Di tutti i dosaggi sono disponibili confezioni da 100 compresse divisibili.

Titolare dell'omologazione

Merck (Svizzera) SpA, Zugo

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

