

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Pinikehl D5, solution injectable

Médicament homéopathique

Quand Pinikehl D5, solution injectable est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Pinikehl D5, solution injectable peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas d'accès de fièvre accompagné de nausée persistante avec des douleurs épigastriques.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Pinikehl D5, solution injectable peut être utilisé simultanément.

Quand Pinikehl D5, solution injectable ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

. Ne pas utiliser pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Pinikehl D5, solution injectable peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Pinikehl D5, solution injectable?

Posologie/mode d'emploi chez des adultes: Injecter 1 mL 2 fois par semaine soit par voie intramusculaire, intraveineuse, subcutanée ou intracutanée. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. L'utilisation et la sécurité de Pinikehl D5, solution injectable n'ont à ce jour pas été testées chez les enfants ni les adolescents de moins de 18 ans. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Pinikehl D5, solution injectable peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de Pinikehl D5, solution injectable n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez-en informer votre médecin ou votre pharmacien. L'utilisation de médicaments homéopathiques



peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Pinikehl D5, solution injectable et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'à...» sur le récipient. Garder les médicaments hors de la portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Protéger de la lumière. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Pinikehl D5, solution injectable?

1 ampoule à 1 mL contient:

1 mL Fomes pinicola e mycelio D5 aquos. dilutio conformément aux prescriptions 5b et 11, HAB.

Cette préparation contient en outre des excipients: chlorure de sodium et eau pour injection.

Numéro d'autorisation

54973 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Pinikehl D5, solution injectable? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 10 x 1 mL et 50 x 1 mL.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2002 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

