

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SILACTEN®, GOUTTES pour voie orale

Hänseler AG

Médicament homéopathique

Quand Silacten est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Silacten contribue à stimuler d'allaitement.

L'utilisation de ce médicament dans le domaine d'application mentionné repose sur les principes d'une orientation thérapeutique homéopathique.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Silacten peut être pris simultanément.

Quand Silacten ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Silacten ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à la quinine (Chine, Cinchona pubescens). Ce médicament n'est pas destiné aux enfants, aux jeunes de moins de 18 ans et aux hommes.

Ce médicament contient 51.2 % en volume d'éthanol (alcool), c'est-à-dire jusqu'à 361 mg pour 15 gouttes, ce qui correspond à 9 ml de bière ou 4 ml de vin pour 15 gouttes.

La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a pas d'effet perceptible.

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste si

- vous souffrez d'autres maladies,
- vous avez des allergies ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Silacten peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base de l'expérience acquise à ce jour, aucun risque n'est connu pour l'enfant si le produit est utilisé conformément aux instructions. Des études scientifiques systématiques n'ont toutefois jamais été menées. Par mesure de précaution, vous devriez si possible renoncer à prendre des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement ou demander conseil au médecin, au pharmacien ou au droguiste.

Comment utiliser Silacten?

Pour les femmes qui allaitent, sauf prescription contraire du médecin: prendre 15 gouttes 3 à 5 fois par jour entre les repas dans un peu de liquide.

Silacten ne doit pas être utilisé chez les enfants, les adolescents et les hommes.

Respectez la posologie indiquée dans la notice d'emballage ou prescrite par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Silacten peut-il provoquer?

La prise de Silacten peut provoquer les effets secondaires suivants: Dans des rares cas, allergies à l'un des composants (Cinchona pubescens).



Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver temporairement (première aggravation). Si l'aggravation persiste, arrêtez de prendre le Silacten et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Durabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver le récipient fermé.

Conserver hors de la portée des enfants.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient le Silacten?

1 ml de liquide contient:

Principes actifs

0.1 ml Calcium phosphoricum (PPH) D11, 0.1 ml Cinchona pubescens (PPH) D3, 0.1 ml Galega officinalis ex semine siccato (PPH) D2, 0.1 ml Ricinus communis ex semen D2 (PPH 4a), 0.1 ml Solidago virgaurea (PPH) D3, 0.1 ml Urtica urens (PPH) D3.

Excipients

Éthanol, eau

Contient 51.2% d'alcool en volume

1 ml correspond à 17 gouttes.

Numéro d'autorisation

19968 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Silacten? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans prescription ordonnance médicale.

Emballages avec 1 flacon compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

Hänseler AG, CH-9100 Herisau

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

