

Informazioni destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista (o del suo droghiere*). Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SILACTEN®, GOCCE per uso orale

Hänseler AG

Medicamento omeopatico

Quando si usa Silacten?

Secondo il quadro farmacologico omeopatico, Silacten aiuta a stimolare l'allattamento. L'uso di questo medicamento nel suddetto ambito si basa su i principi della terapia omeopatica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al medico o al farmacista se Silacten può essere assunto contemporaneamente.

Quando non si può usare Silacten e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Silacten non deve essere in caso di ipersensibilità alla chinina (China, Cinchona pubescens). Non adatto a bambini, adolescenti sotto i 18 anni e uomini.

Questo medicamento contiene il 51.2 % di etanolo (alcol) in volume, cioè fino a 361 mg per 15 gocce, corrispondenti a 9 ml di birra o 4 ml di vino per 15 gocce.

La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicamento non ha effetti percepibili.

Informi il medico o il farmacista se

- soffre di altre malattie,
- ha allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (compresi quelli acquistati autonomamente!)

Si può assumere Silacten durante la gravidanza o l'allattamento?

In base all'esperienza precedente, non ci sono rischi noti per il bambino se usato come indicato. Tuttavia, non sono mai stati condotti studi scientifici sistematici. Per precauzione, si consiglia di evitare l'assunzione di medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o di chiedere consiglio al medico o al farmacista.

Come usare Silacten?

Per le donne che allattano, salvo diversa prescrizione medica: assumere 15 gocce 3-5 volte al giorno tra i pasti con un sorso d'acqua.

Silacten non deve essere utilizzato da bambini, adolescenti e uomini.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Silacten?

Il seguito all'assunzione di Silacten possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: In rari casi allergie a una delle componenti (Cinchona pubescens).

Se si notano effetti collaterali, contattare il medico o il farmacista. Questo vale anche e soprattutto per gli effetti collaterali non specificati in questo foglio illustrativo.



Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Silacten e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Scadenza

Il medicinale non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni per la conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Tenere ben chiuso il contenitore.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro medico, farmacista o droghista o alla vostra dottoressa, farmacista o droghista.

Cosa contiene Silacten?

1 ml di liquido contiene:

Principi attivi

0.1 ml di Calcium phosphoricum (Farmacopea omeopatica) D11, 0.1 ml di Cinchona pubescens (Farmacopea omeopatica) D3, 0.1 ml di Galega officinalis ex semine siccato (Farmacopea omeopatica) D2, 0.1 ml di Ricinus communis ex semine D2 (Farmacopea omeopatica 4a), 0.1 ml di Solidago virgaurea (Farmacopea omeopatica) D3, 0.1 ml di Urtica urens (Farmacopea omeopatica) D3.

Eccipienti

Etanolo, acqua

Contiene 51.2 % di alcol in volume

1 ml corrisponde a 17 gocce.

Numero dell'omologazione

19968 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Silacten? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione con 1 flacone contagocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Hänseler AG, CH-9100 Herisau

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

