

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Trimbow® 88/5/9 microgrammi, polvere per inalazione

Chiesi SA

Che cos'è Trimbow e quando si usa?

Su prescrizione medica.

Trimbow è un medicinale che contiene tre principi attivi:

- beclometasone dipropionato,
- formoterolo fumarato diidrato e
- glicopirronio bromuro.

Il beclometasone dipropionato appartiene a un gruppo di medicinali denominati corticosteroidi, i quali svolgono un'azione antinfiammatoria riducendo il gonfiore e l'irritazione nei polmoni.

Il formoterolo e il glicopirronio sono medicinali chiamati broncodilatatori a lunga durata d'azione. Essi rilassano i muscoli delle vie aeree attraverso meccanismi diversi, grazie ai quali dilatano le vie aeree e facilitano la respirazione.

Trimbow 88/5/9 viene usato su prescrizione medica per il trattamento regolare della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a severa negli adulti, dopo che altre terapie hanno mostrato un'insufficiente efficacia. La BPCO è una grave malattia cronica caratterizzata dall'ostruzione delle vie aeree e da danni agli alveoli polmonari, con conseguente difficoltà a respirare.

Deve utilizzare Trimbow ogni giorno, e non solo quando ha problemi respiratori o altri sintomi, al fine di garantire un adeguato controllo della malattia.

Quando non si può usare Trimbow?

Non usi Trimbow se è allergico al beclometasone dipropionato, al formoterolo fumarato diidrato e al glicopirronio o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo «Cosa contiene Trimbow?»).

Non usi questo medicinale per il trattamento di una crisi acuta di mancanza di respiro o respiro sibilante. Se compare una simile crisi, deve utilizzare il suo inalatore di emergenza a effetto rapido.

Non somministrare questo medicinale a bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni.

Quando è richiesta prudenza nella nell'uso di Trimbow?

Trimbow è usato come terapia di mantenimento per la malattia polmonare ostruttiva. Non usi questo medicinale per il trattamento di una crisi acuta di mancanza di respiro o respiro sibilante.

Se la respirazione peggiora:

Se manifesta un peggioramento del respiro corto o del respiro sibilante (fischio udibile durante la respirazione) subito dopo l'inalazione del medicinale, smetta di usare l'inalatore di Trimbow e usi subito il suo inalatore «sintomatico» (di emergenza) ad azione rapida. Si rivolga subito al medico, che valuterà i sintomi e, se necessario, le prescriverà un trattamento diverso. Vedere anche paragrafo «Quali effetti collaterali può avere Trimbow?».

Se la malattia polmonare peggiora:

Se i sintomi peggiorano o sono difficili da tenere sotto controllo (ad es. se deve usare sempre più spesso un inalatore «sintomatico»), o se l'inalatore «sintomatico» non riesce a migliorare i sintomi, si rivolga



immediatamente al medico. La malattia polmonare ostruttiva potrebbe essere in fase di peggioramento e il medico potrebbe prescrivere un trattamento diverso.

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Trimbow:

- se ha problemi al cuore, come l'angina (dolore al cuore, dolore al torace), un attacco cardiaco (infarto miocardico) recente, un'insufficienza cardiaca, un restringimento delle arterie che circondano il cuore (cardiopatia coronarica), una malattia delle valvole cardiache o qualsiasi altra anomalia del cuore, o se soffre di una malattia chiamata cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (o CMI, una malattia caratterizzata da un'anomalia del muscolo cardiaco).
- se ha disturbi del ritmo cardiaco come battito cardiaco irregolare, polso rapido o palpitazioni, o se ha un tracciato cardiaco (ECG) anomalo.
- se ha un restringimento delle arterie (noto come arteriosclerosi), se ha la pressione sanguigna elevata o se ha un aneurisma (una dilatazione anomala della parete di un vaso sanguigno).
- se ha una tiroide iperattiva.
- se ha bassi livelli di potassio nel sangue (ipokaliemia). La combinazione di Trimbow con altri medicinali per i polmoni diuretici (farmaci per eliminare l'acqua dall'organismo, per il trattamento di malattie cardiache o della pressione sanguigna elevata) può determinare una riduzione marcata dei livelli di potassio nel sangue. Pertanto, il medico potrebbe misurare periodicamente i livelli di potassio nel sangue.
- se ha una qualsiasi malattia del fegato o dei reni.
- se ha il diabete. Dosi elevate di formoterolo possono far aumentare i livelli di glucosio nel sangue; quando inizia a usare questo medicinale e periodicamente durante il trattamento dovrà quindi eventualmente sottoporsi a ulteriori analisi del sangue per misurare la glicemia.
- se ha un tumore delle ghiandole surrenali (chiamato feocromocitoma).
- se deve sottoporsi a un'anestesia. In base al tipo di anestetico, può essere necessario interrompere il trattamento con Trimbow almeno 12 ore prima dell'anestesia.
- se è o è stato in trattamento per la tubercolosi (TB) o se ha un'infezione al torace.
- se ha un problema agli occhi chiamato glaucoma ad angolo chiuso.
- se ha difficoltà ad urinare.
- se ha un'infezione della bocca o della gola.

Se una qualsiasi di queste condizioni la riguarda, informi il medico prima di usare Trimbow.

Se ha o ha avuto un qualsiasi problema di carattere medico o un'allergia, o se non è sicuro se può usare Trimbow, si rivolga al medico o al farmacista prima di usare l'inalatore.

Se sta già usando Trimbow

Se sta usando Trimbow o dosi elevate di altri corticosteroidi inalatori per periodi prolungati e viene a trovarsi in una situazione di stress (ad es. ricovero in ospedale dopo un infortunio, in caso di lesioni gravi o prima di un intervento chirurgico), può avere bisogno di una quantità maggiore di questo medicinale. In questa situazione, il medico può avere bisogno di aumentare la dose di corticosteroidi per combattere lo stress e può prescrivere sotto forma di compresse o iniezioni.

Contatti il medico se si presentano visione offuscata o altri disturbi visivi.

Bambini e adolescenti

Non somministrare questo medicinale a bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni.

Altri medicinali e Trimbow

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Questo vale anche per i medicinali simili a Trimbow usati per la malattia



polmonare di cui soffre.

Alcuni medicinali possono aumentare gli effetti di Trimbow e il medico potrebbe volerla tenere sotto stretta osservazione se sta assumendo questi medicinali (compresi alcuni medicinali per l'HIV: ritonavir, cobicistat).

Non usi questo medicinale con un beta-bloccante (utilizzati per il trattamento di determinati problemi al cuore, come l'angina, o per abbassare la pressione sanguigna), a meno che il medico non abbia scelto un beta-bloccante che non compromette la respirazione. I beta-bloccanti (inclusi i colliri a base di beta-bloccanti) possono ridurre gli effetti del formoterolo o annullarli del tutto. D'altro lato, l'uso di altri medicinali beta2-agonisti (che hanno un'azione simile a quella del formoterolo) può aumentare gli effetti del formoterolo.

L'uso di Trimbow insieme a:

- medicinali per il trattamento
 - delle anomalie del ritmo cardiaco (chinidina, disopiramide, procainamide),
 - delle reazioni allergiche (antistaminici),
 - dei sintomi della depressione o di disturbi mentali come gli inibitori delle monoaminossidasi (ad esempio fenelzina e isocarbossazide), antidepressivi triciclici (ad esempio amitriptilina e imipramina), fenotiazine

può determinare alterazioni all'elettrocardiogramma (ECG, tracciato dell'attività cardiaca). Possono anche aumentare il rischio di disturbi del ritmo cardiaco (aritmie ventricolari).

- medicinali per il trattamento della malattia di Parkinson (levodopa), per il trattamento di una funzione insufficiente della ghiandola tiroide (levotiroxina), medicinali contenenti ossitocina (che fanno contrarre l'utero) e alcol, può aumentare la probabilità di effetti indesiderati cardiaci dovuti al formoterolo.
- inibitori delle monoaminossidasi (IMAO), tra cui medicinali con proprietà simili come furazolidone e procarbazina, usati per il trattamento di disturbi mentali, può far aumentare la pressione sanguigna.
- medicinali per il trattamento di malattie cardiache (digossina), può far diminuire i livelli di potassio nel sangue. Questo può aumentare la probabilità di anomalie del ritmo cardiaco.
- altri medicinali usati per il trattamento della malattia polmonare ostruttiva (teofillina, aminofillina o corticosteroidi) e diuretici, può far diminuire i livelli di potassio nel sangue.
- alcuni anestetici, può aumentare il rischio di anomalie del ritmo cardiaco.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare macchine in seguito all'uso di Trimbow.

Trimbow contiene lattosio

Il lattosio contiene piccole quantità di proteine del latte, che possono causare reazioni allergiche.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Trimbow durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Usi Trimbow durante la gravidanza soltanto se le è stato consigliato dal medico. È preferibile evitare di usare Trimbow durante il travaglio, a causa dell'effetto inibitorio del formoterolo sulle contrazioni uterine.



Non usi Trimbow durante l'allattamento. Lei e il medico dovete prendere la decisione se interrompere l'allattamento o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con Trimbow tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per lei.

Come usare Trimbow?

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti

La dose raccomandata è di due inalazioni al mattino e due inalazioni alla sera.

Non usi più medicinale di quanto le è stato indicato dal medico.

Deve usare Trimbow ogni giorno, anche se non ha sintomi.

Non usi questo medicinale per il trattamento di una crisi improvvisa di mancanza di respiro o respiro sibilante.

Se in passato ha usato un inalatore diverso contenente beclometasone dipropionato, chiedi consiglio al medico, perché la dose efficace di beclometasone dipropionato contenuta in Trimbow per il trattamento della sua malattia polmonare ostruttiva può essere più bassa di quella di altri inalatori.

Via di somministrazione

Trimbow è per uso inalatorio.


Deve inalare il medicinale attraverso la bocca: in questo modo, il medicinale raggiunge direttamente i polmoni.

Istruzioni per l'uso

Avvertenze generali e precauzioni d'uso

- Non togliere l'inalatore dalla bustina se non si ha intenzione di usarlo immediatamente.
- Usare l'inalatore solo secondo le istruzioni.
- Tenere chiuso il coperchio finché non si deve prendere una dose dall'inalatore.
- Quando non si usa l'inalatore, tenerlo in un luogo pulito e asciutto.
- Non tentare per alcun motivo di smontare l'inalatore.

A. Caratteristiche principali dell'inalatore



L'assunzione di una dose dall'inalatore richiede tre passaggi: Apertura, Inalazione, Chiusura.

B. Prima di usare un inalatore nuovo

1. Aprire la bustina e tirare fuori l'inalatore.
 - Non usare l'inalatore se la bustina non è sigillata o è danneggiata; restituirlo alla persona che lo ha



fornito e procurarsene uno nuovo.


- Usare l'etichetta sulla scatola per annotare la data in cui si è aperta la bustina.

2. Ispezionare l'inalatore.

- Se l'inalatore appare rotto o danneggiato, restituirlo alla persona che lo ha fornito e procurarsene uno nuovo.

3. Controllare la finestra del contadosi. Se l'inalatore è nuovo, la finestra del contadosi indicherà «120».


- Non usare un inalatore nuovo se il numero indicato è inferiore a «120»; restituirlo alla persona che lo ha fornito e procurarsene uno nuovo.



C. Come usare l'inalatore

C.1. Apertura

1. Tenere fermamente l'inalatore in posizione verticale.
2. Verificare il numero di dosi rimanenti: qualsiasi numero tra «1» e «120» indica quante dosi rimangono. Se la finestra del contadosi indica «0», non restano più dosi; smaltire l'inalatore e procurarsene uno nuovo.
3. Aprire completamente il coperchio.



Nota: Aprire il coperchio dell'inalatore solo quando si è pronti a inalare. Se si apre e si chiude il coperchio senza inalare dal dispositivo, la dose viene riportata nel serbatoio della polvere all'interno dell'inalatore. La dose successiva può essere inalata in tutta sicurezza.

4. Prima di inalare, espirare il più a fondo possibile senza sforzo. Non espirare attraverso l'inalatore.

C.2. Inalazione

Se possibile, stare in piedi o seduti in posizione eretta durante l'inalazione.

1. Sollevare l'inalatore, portarlo alla bocca e mettere le labbra intorno al boccaglio.
Non coprire lo sfiato dell'aria quando si tiene in mano l'inalatore.
Non inalare attraverso lo sfiato dell'aria.
2. Fare un respiro forte e profondo attraverso la bocca.
Quando si assume la dose si può notare un sapore particolare.
Quando si prende la dose si può udire o avvertire un clic.
Non inalare attraverso il naso.
Non togliere l'inalatore dalle labbra durante l'inalazione.






3. Togliere l'inalatore dalla bocca.
4. Trattenere il fiato per 5-10 secondi o il più a lungo possibile senza sforzarsi.
5. Espirare lentamente.

Non espirare attraverso l'inalatore.

Se non si è sicuri di stare assumendo la dose correttamente, rivolgersi al farmacista o al medico.

C.3. Chiusura

1. Riportare l'inalatore in posizione verticale e chiudere completamente il coperchio.
2. Verificare che il contadosi indichi una unità in meno.



Se non si è sicuri che il contadosi indichi una unità in meno dopo l'inalazione, attendere fino alla successiva dose programmata e prenderla normalmente. Non prendere una dose aggiuntiva.

3. Se è necessario prendere un'altra dose, ripetere i passaggi da C.1 a C.3.

D. Pulizia

- Generalmente, non è necessario pulire l'inalatore.
- Se necessario, è possibile pulire l'inalatore dopo l'uso con un panno o un fazzoletto asciutto.

Non pulire l'inalatore con acqua o altri liquidi. Mantenerlo asciutto.

Per prevenire un'infezione da funghi in bocca e in gola, si sciacqui la bocca o faccia gargarismi con acqua senza deglutirla o si lavi i denti ogni volta che ha usato l'inalatore.

Se usa più Trimbow di quanto deve

È importante che prenda la dose come prescritto dal medico. Non prenda una dose superiore a quella prescritta senza aver consultato il medico.



Se usa più Trimbow di quanto deve possono manifestarsi effetti indesiderati, come descritto nel paragrafo «Quali effetti collaterali può avere Trimbow?».

Informi il medico se ha usato più Trimbow di quanto doveva e se si manifesta uno qualsiasi di questi sintomi. Il medico potrebbe decidere di effettuare alcune analisi del sangue.

Informi il medico se manifesta uno qualsiasi di questi sintomi.

Se dimentica di usare Trimbow

Lo usi non appena se ne ricorda. Se è quasi l'ora della dose successiva, non prenda la dose dimenticata, ma prenda la dose successiva all'ora prevista. Non raddoppi la dose.

Se interrompe il trattamento con Trimbow

È importante usare Trimbow ogni giorno. Non interrompa il trattamento con Trimbow e non riduca la dose, neanche se si sente meglio o non ha sintomi. Se vuole farlo, si rivolga al medico.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista

Quali effetti collaterali può avere Trimbow?

Immediatamente dopo l'uso di Trimbow esiste il rischio che il respiro corto e il respiro sibilante peggiorino, e questo effetto è noto come broncospasmo paradossico (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000). In tal caso, interrompa il trattamento con Trimbow e usi subito il suo inalatore «sintomatico» ad azione rapida per trattare il respiro corto e il respiro sibilante. Si rivolga subito al medico.

Informi immediatamente il medico

- se manifesta una qualsiasi reazione allergica come allergie cutanee, orticaria, prurito cutaneo, eruzione cutanea (riguarda da 1 a 10 persone su 1000), arrossamento cutaneo, gonfiore della cute o delle mucose e in particolare degli occhi, del viso, delle labbra e della gola (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000).
- se manifesta dolore o fastidio agli occhi, offuscamento transitorio della vista, visione di aloni o immagini colorate in associazione con occhi arrossati. Questi possono essere segni di un attacco acuto di glaucoma ad angolo chiuso (riguarda meno di 1 persone su 10 000).

Informi il medico se durante l'uso di Trimbow compare uno qualsiasi dei sintomi seguenti, perché possono essere sintomi di un'infezione ai polmoni (riguarda da 1 a 10 persone affette da BPCO su 100):

- febbre o brividi
- aumento della produzione di muco, cambiamento di colore del muco
- aumento della tosse o della difficoltà a respirare.

I possibili effetti indesiderati sono riportati di seguito in ordine di frequenza.

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100):

- mal di gola
- naso che cola o naso chiuso e starnuti
- infezioni da funghi della bocca. Sciacquandosi la bocca o facendo gargarismi con acqua o lavandosi i denti immediatamente dopo l'inalazione si possono prevenire questi effetti indesiderati
- raucedine
- mal di testa
- infezione delle vie urinarie.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000):

- influenza



- infiammazione dei seni paranasali
- prurito al naso, naso che cola o naso chiuso
- infezioni da funghi della gola o dell'esofago
- infezioni da funghi della vagina
- irrequietezza
- tremore
- capogiro
- anomalia o riduzione del senso del gusto
- intorpidimento
- infiammazione dell'orecchio
- battito cardiaco irregolare
- alterazioni all'elettrocardiogramma (tracciato dell'attività cardiaca)
- battito cardiaco troppo rapido e disturbi del ritmo cardiaco
- palpitazioni (sensazione di battito cardiaco anomalo)
- arrossamento del viso
- aumento del flusso di sangue in alcuni tessuti dell'organismo
- attacco d'asma
- tosse e tosse produttiva
- irritazione della gola
- perdite di sangue dal naso
- arrossamento della faringe
- bocca secca
- diarrea
- difficoltà a deglutire
- senso di malessere
- disturbi allo stomaco
- mal di stomaco dopo i pasti
- sensazione di bruciore alle labbra
- carie
- eruzione cutanea, orticaria, prurito cutaneo
- infiammazione delle mucose della bocca, con o senza ulcere
- aumento della sudorazione
- crampi muscolari e dolore ai muscoli
- dolore alle braccia o alle gambe
- dolore ai muscoli, alle ossa o alle articolazioni del torace
- stanchezza
- aumento della pressione sanguigna
- livelli ridotti di alcuni componenti del sangue: di un tipo di globuli bianchi chiamati granulociti, del potassio o del cortisolo



- aumento dei livelli di alcuni componenti del sangue: glucosio, proteina C reattiva, numero di piastrine, insulina, acidi grassi liberi o chetoni.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000):

- infezioni da funghi al torace
- riduzione dell'appetito
- disturbo del sonno (dorme troppo poco o troppo a lungo)
- dolore lancinante al torace
- sensazione di mancanza di un battito cardiaco o di battiti cardiaci in più, battito cardiaco troppo lento
- peggioramento dell'asma
- fuoriuscita di sangue da un vaso nei tessuti circostanti
- diminuzione della pressione sanguigna
- debolezza
- dolore in fondo alla bocca e alla gola
- infiammazione della faringe
- gola secca
- minzione dolorosa e frequente
- difficoltà e dolore alla minzione
- infiammazione dei reni.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000):

- basso numero di determinate cellule del sangue chiamate piastrine
- mancanza di respiro o respiro corto
- gonfiore delle mani e dei piedi
- ritardo della crescita

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- visione offuscata

L'uso di dosi elevati di corticosteroidi inalatori per periodi prolungati può causare, in casi molto rari, effetti su tutto l'organismo:

- problemi della funzione delle ghiandole surrenali (soppressione surrenale)
- riduzione della densità minerale ossea (assottigliamento delle ossa)
- opacità del cristallino (cataratta).

Trimbrow non contiene dosi elevate di corticosteroidi inalatorio, ma il medico potrebbe voler misurare periodicamente i livelli di cortisolo nel sangue.

Con i corticosteroidi inalatori a dosi elevate usati per periodi prolungati possono manifestarsi anche i seguenti effetti indesiderati, ma la frequenza non è nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- depressione
- senso di preoccupazione, nervosismo, ipereccitazione o irritabilità.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.



Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo la prima apertura della bustina, il medicinale deve essere usato entro 6 settimane e conservato in un luogo asciutto. Non conservare in frigorifero e non congelare. Usi l'etichetta adesiva sulla scatola esterna per annotare la data in cui apre la bustina e attacchi questa etichetta sul fondo dell'inalatore.

Indicazione di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non conservare a temperatura superiore a 25 °C. Conservare l'inalatore nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità e toglierlo dalla bustina solo immediatamente prima del primo utilizzo. Non conservare in frigorifero e non congelare.

Ulteriori indicazioni

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Trimbow?

Principi attivi

Beclometasone dipropionato, formoterolo fumarato diidrato e glicopirronio bromuro.

Ogni dose erogata dal boccaglio (dose che esce dal boccaglio) contiene 88 microgrammi di beclometasone dipropionato, 5 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato e 9 microgrammi di glicopirronio (sotto forma di 11 microgrammi di glicopirronio bromuro).

Ogni dose misurata (prima del boccaglio) contiene 100 microgrammi di beclometasone dipropionato, 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato e 10 microgrammi di glicopirronio (sotto forma di 12,5 microgrammi di glicopirronio bromuro).

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato e magnesio stearato.

Trimbow è una polvere per inalazione di colore da bianco a quasi bianco. È fornito in un inalatore in plastica bianca dotato di coperchio grigio e di un contatore per le inalazioni.

Numero dell'omologazione

69163 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Trimbow? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Trimbow 88/5//9, polvere per inalazione

Confezione da 1 inalatore con 120 inalazioni [B]

Confezione multipla con 360 inalazioni (3 inalatori da 120 inalazioni ciascuno) [B]

Ogni inalatore è confezionato in una bustina protettiva.

Titolare dell'omologazione

Chiesi SA, 1752 Villars-sur-Glâne



Distribuzione

OM Pharma Suisse SA, 1752 Villars-sur-Glâne

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

