

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Kemadrin®

Qu'est-ce que Kemadrin et quand est-il utilisé?

Kemadrin est un anticonvulsif de synthèse, utilisé dans le traitement de toutes les formes de maladie de Parkinson (paralysie agitante), y compris du syndrome parkinsonien d'origine médicamenteuse.

Kemadrin supprime la rigidité musculaire et atténue les tremblements. Sa prise procure en outre une amélioration de la coordination musculaire et de la performance, accroît l'activité et stimule l'attention. Le produit améliore l'humeur et le bien-être général; il agit favorablement sur la fatigue et les états dépressifs qui en résultent.

Kemadrin est également utilisé pour supprimer les effets indésirables de type parkinsonien dus à d'autres médicaments.

Kemadrin ne doit être utilisé que sur prescription du médecin et sous contrôle médical permanent.

Quand Kemadrin ne doit-il pas être pris?

Kemadrin ne doit pas être utilisé lors d'une hypersensibilité connue ou supposée à la procyclidine ou à l'un des composants du produit. Les patients souffrant de myasthénie grave ne doivent pas prendre Kemadrin.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Kemadrin?

Kemadrin sera utilisé avec une prudence particulière en cas de glaucome, dans les affections gastro-intestinales comportant un obstacle au transit, et dans l'hypertrophie de la prostate, accompagnée de difficultés à uriner, de même qu'en présence de troubles de la fonction hépatique ou rénale.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez ou utiliser déjà d'autres médicaments (même en automédication!) en usage externe. Cela s'applique tout particulièrement aux médicaments destinés au traitement des affections psychiques (les inhibiteurs MAO, les antidépresseurs tricycliques, les phénothiazines, par exemple), des mycoses (le kétoconazole, par exemple), des troubles du rythme cardiaque (la quinidine, le disopyramide, par exemple) et de la maladie d'Alzheimer (la tacrine, la mémantine, par exemple), mais aussi aux calmants, aux antihistaminiques, aux médicaments contre l'hyperacidité gastrique et à d'autres antiparkinsoniens (l'amantadine, la lévodopa, par exemple).

La prise quotidienne de paroxétine, un principe actif utilisé dans les dépressions et d'autres maladies psychiques, augmente la concentration de Kemadrin dans le plasma sanguin. En cas de survenue d'effets secondaires, votre médecin devra diminuer la dose de Kemadrin.

Kemadrin peut atténuer l'action des médicaments qui augmentent la motilité de l'estomac et de l'intestin grêle, tels que la cisapride, le métoclopramide et la dompéridone.



Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à conduire et la capacité à utiliser des outils ou des machines.

L'utilisation et la sécurité d'emploi n'ont pas été étudiées chez l'enfant et l'adolescent.

Excipients

Lactose

Les comprimés de Kemadrin contiennent du lactose. Veuillez ne prendre les comprimés de Kemadrin qu'après avoir consulté votre médecin si vous savez que vous souffrez d'une intolérance au sucre.

Sodium

Les comprimés de Kemadrin contiennent moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

Kemadrin peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

L'innocuité de Kemadrin pendant la grossesse n'a pas été démontrée. Vous ne devez utiliser Kemadrin pendant la grossesse que si votre médecin vous l'a prescrit expressément.

Il n'existe pas de données sur l'excrétion de Kemadrin dans le lait maternel. Kemadrin ne doit pas être pris pendant la période d'allaitement. Si vous allaitez votre enfant, veuillez consulter votre médecin.

Comment utiliser Kemadrin?

La posologie adaptée à votre cas sera fixée par votre médecin en fonction de la nature et de la gravité de votre maladie. Elle sera toujours augmentée progressivement.

La dose initiale est d'un demi-comprimé 3 fois par jour. Au besoin, cette posologie peut être augmentée d'un demi ou d'un comprimé tous les 1 à 3 jours jusqu'à l'obtention de l'action optimale. La dose d'entretien usuelle se situe entre 10 et 30 mg par jour, suivant la nature et la gravité de la maladie; dans des cas isolés, une dose allant jusqu'à 60 mg par jour peut être requise.

Les patients âgés ont en général besoin de doses plus faibles, car ils réagissent de manière plus sensible à Kemadrin.

Chez les patients présentant des troubles de la fonction hépatique ou rénale, la dose sera adaptée individuellement par le médecin. À ce jour, l'utilisation et la sécurité d'emploi de Kemadrin n'ont pas été étudiées chez l'enfant et l'adolescent. Les recommandations de dosages décrites ci-dessus concernent les adultes.

Pour assurer une meilleure tolérance, les comprimés devraient être pris avec les repas. Le sillon décoratif des comprimés de Kemadrin ne permet pas de diviser les comprimés.

A l'exception des cas d'urgence, il ne faut pas arrêter brusquement le traitement.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Kemadrin peut-il provoquer?

La prise ou l'utilisation de Kemadrin peut provoquer les effets secondaires suivants:

Les principaux effets indésirables peuvent apparaître sous forme de sécheresse de la bouche, de troubles de la vision, de constipation et de difficultés à uriner. Occasionnellement, des nausées, des vomissements, une inflammation des gencives, une nervosité et des éruptions cutanées ont également été observés.



En outre, des vertiges, de la confusion, des troubles de la mémoire, de la perception et de l'orientation, de l'anxiété, de l'agitation et des hallucinations peuvent se manifester sous Kemadrin. Chez les patients âgés, ces effets secondaires psychiques peuvent apparaître même à des doses plus faibles.

Le médecin doit être informé de toute apparition d'effets indésirables pour pouvoir procéder à une réduction de la posologie, le cas échéant.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Le médicament ne doit être utilisé au-delà de la date figurant après la mention "EXP" sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver les comprimés de Kemadrin à température ambiante (15 – 25°C) et tenir hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Kemadrin?

Principes actifs

1 comprimé avec sillon décoratif de Kemadrin contient 5 mg de chlorhydrate de procyclidine.

Excipients

Lactose monohydraté, carboxyméthylamidon sodique (type A), povidone K 30, stéarate de magnésium

Numéro d'autorisation

22'562 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Kemadrin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Kemadrin: emballages de 100 comprimés avec sillon décoratif.

Titulaire de l'autorisation

Aspen Pharma Schweiz GmbH, Baar

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

