

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

WALA Baume pectoral au plantain, Crème

Médicament anthroposophique

Quand WALA Baume pectoral au plantain est-il utilisé?

Selon la conception anthroposophique de l'homme et de la nature, WALA Baume pectoral au plantain peut être utilisé en cas de toux et de toux bronchique.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de la conception anthroposophique de l'homme et de la nature.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si la toux persiste durant plus de 7 jours.

Si un enfant a avalé accidentellement WALA Baume pectoral au plantain, consultez immédiatement un médecin.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si WALA Baume pectoral au plantain peut être utilisé simultanément.

Quand WALA Baume pectoral au plantain ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

WALA Baume pectoral au plantain ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité ou d'allergie croisée à l'un des composants. WALA Baume pectoral au plantain peut provoquer des irritations locales de la peau (p. ex. dermatite de contact).

WALA Baume pectoral au plantain contient de l'huile d'arachide. Il ne doit pas non plus être utilisé si vous êtes hypersensible (allergique) aux cacahuètes ou au soja.

WALA Baume pectoral au plantain ne doit pas être utilisé chez les nourrissons et les enfants en bas âge jusqu'à 36 mois (danger de crampe du larynx). WALA Baume pectoral au plantain doit être utilisé avec prudence chez les enfants âgés de 36 mois à 11 ans.

Les femmes allaitantes ne doivent pas appliquer le médicament sur la poitrine.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe même en automédication!

WALA Baume pectoral au plantain peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments



durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, votre pharmacien ou de votre droguiste.

Les femmes allaitantes ne doivent pas appliquer le médicament sur la poitrine.

Comment utiliser WALA Baume pectoral au plantain?

Sauf prescription contraire du médecin, enfants à partir de 3 ans, adolescents et adultes: appliquer matin et soir de la crème sur la poitrine et le dos et tenir au chaud en recouvrant d'un linge.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Les femmes allaitantes ne doivent pas appliquer le médicament sur la poitrine.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires WALA Baume pectoral au plantain peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent survenir dans des cas isolés lors de l'utilisation de WALA Baume pectoral au plantain: réactions locales d'hypersensibilité (démangeaisons accompagnées d'éruptions cutanées) et, par ailleurs, réactions cutanées (p. ex. eczéma, exanthème, éruption cutanée, irritations, démangeaisons, dermatite de contact, rougeur, gonflement et hypersensibilité de la peau), allergies et difficulté respiratoire.

Dans ce cas, WALA Baume pectoral au plantain ne doit plus être utilisé.

Ce médicament contient 10 mg d'alcool (éthanol) par gramme de crème (1% m/m). Il peut provoquer une sensation de brûlure sur la peau endommagée.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C) et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient WALA Baume pectoral au plantain?

1 g de crème contient:

Principes actifs

150 mg Cera flava, 20 mg D-Camphora, 10 mg Drosera rotundifolia/intermedia/anglica e planta tota rec. ferm 33c D3 (HAB 33c), 5 mg Eucalyptus aetheroleum (Eucalyptus L'Hér. Spp., aetheroleum), 10 mg Petasites hybridus e radice rec. ferm 33c D1 (HAB 33c), 10 mg Plantago lanceolata e foliis rec. ferm 34c D1 (HAB 34c), 50 mg Terebinthina laricina (HAB), 5 mg Thymi typico thymolo aetheroleum (Thymus vulgaris L., Thymus zygis L., aetheroleum).



Excipients

140 mg lanoline, 480 mg huile d'arachide raffinée, eau purifiée, éthanol 96 %.

Numéro d'autorisation

41587 (Swissmedic)

Où obtenez-vous WALA Baume pectoral au plantain? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

WALA Baume pectoral au plantain est disponible en tubes de 30 g et 100 g.

Titulaire de l'autorisation

WALA Schweiz AG, 3011 Berne

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

