

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SIMILASAN Dolori articolari, globuli

Medicamento omeopatico

Quando si usa SIMILASAN Dolori articolari?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici SIMILASAN Dolori articolari può essere usato in caso di disturbi dovuti ad usura (artrosi) delle piccole e grandi articolazioni e della colonna vertebrale e di disturbi dovuti a infiammazione delle articolazioni.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SIMILASAN Dolori articolari.

I disturbi acuti e quelli affrontati prima del loro pieno sviluppo possono migliorare nettamente nell'arco di una fino a tre settimane. I disturbi cronici e l'artrosi (usura dell'articolazione) necessitano naturalmente di una terapia di lunga durata, che soprattutto in caso di forte dolore va discussa insieme al medico.

In caso di artrosi alle estremità inferiori, all'anca e alla colonna vertebrale, si consiglia di far esaminare i piedi (piede piatto, pronato, spianato) e la lunghezza delle gambe per individuare eventuali abitudini viziose.

In caso di continuo peggioramento o mancata guarigione consultare un medico.

Quando non si può assumere SIMILASAN Dolori articolari e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

SIMILASAN Dolori articolari non deve essere somministrato a bambini di età inferiore ai 12 anni.

Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!)

Si può assumere SIMILASAN Dolori articolari durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN Dolori articolari?



Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Adolescenti (sopra i 12 anni) e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- **Disturbi acuti:** 6 volte al giorno. Quando si registra un miglioramento, ridurre la dose.
- **Per la completa guarigione:** 2 - 3 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Non indicato per bambini sotto i 12 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Dolori articolari?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Dolori articolari e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di SIMILASAN Dolori articolari. Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN Dolori articolari?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi



Acidum benzoicum e resina (HAB) D8 (HAB 5a) 3.333 mg / Calcium phosphoricum (HAB) D12 3.333 mg / Harpagophytum procumbens (HAB) D6 3.333 mg.

Sostanze ausiliarie

Xilitolo (E 967) 600 mg, carbonato di calcio.

1 g corrisponde a 70-90 globuli

Numero dell'omologazione

51457 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN Dolori articolari? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: 15 g

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

