

Was ist Kenacort-A Orabase und wann wird es angewendet?

Auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin.

Kenacort-A Orabase ist eine Haftpaste zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen der Mundschleimhaut. Sie enthält als Wirkstoff ein wirksames Kortikosteroid (abgewandeltes körpereigenes Hormon). Kenacort-A Orabase hemmt die Entzündung, lindert Juckreiz und Brennen und wirkt antiallergisch.

Kenacort-A Orabase wird bei entzündlichen Erkrankungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches verwendet. Sie bildet einen glatten Schutzfilm über die Schleimhaut, so dass der Wirkstoff über lange Zeit im engen Kontakt mit der erkrankten Stelle bleibt.

Wann darf Kenacort-A Orabase nicht eingenommen/angewendet werden?

Wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren, dürfen Sie Kenacort-A Orabase nicht anwenden. Eine Behandlung ist für Sie ebenfalls nicht geeignet bei Infektionen der Mundschleimhaut mit Pilzen, Viren oder Bakterien.

Wann ist bei der Einnahme/Anwendung von Kenacort-A Orabase Vorsicht geboten?

Bei lokalen Unverträglichkeiten von Kenacort-A Orabase darf das Arzneimittel nicht weiter verwendet werden. Patienten mit Tuberkulose, Magengeschwür oder Zuckerkrankheit sollen das Arzneimittel nur auf Anordnung des Arztes oder der Ärztin hin anwenden.

Einige Arzneimittel können die Wirkungen von Kenacort-A Orabase verstärken, und Ihr Arzt wird Sie möglicherweise sorgfältig überwachen, wenn Sie diese Arzneimittel einnehmen (einschliesslich einiger Arzneimittel gegen HIV: Ritonavir, Cobicistat).

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden (speziell Diabetes, Tuberkulose, Magengeschwür), Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekauft!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit, die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit, Werkzeuge oder Maschinen zu bedienen, beeinträchtigen!

Darf Kenacort-A Orabase während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen/angewendet werden?

Wenn Sie schwanger sind oder es werden möchten, sollen Sie Kenacort-A Orabase ausschliesslich nach Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin anwenden.

Während der Stillperiode sollte das Arzneimittel nicht angewendet werden.

Wie verwenden Sie Kenacort-A Orabase?

Ihr Arzt oder Ihre Ärztin setzt die Häufigkeit und die Dauer der Anwendung fest. Es ist wichtig, dass Sie sich an seine bzw. ihre Anweisungen halten.

Im Allgemeinen gelten folgende Richtlinien:

2–3 mal täglich auftragen, am besten nach dem Essen und vor dem Schlafen. Etwa ½ cm Salbenstrang wird auf die erkrankte Stelle gebracht (bei ausgedehnten Erkrankungen kann eine grössere Menge erforderlich sein). Nur soviel Haftpaste verwenden, dass die Stelle mit einem dünnen Film bedeckt ist. Die Haftpaste soll nicht einmassiert werden, da sie sonst bröckelt. Da schon der leichteste Kontakt mit der Schleimhaut den Haftprozess auslöst, ist darauf zu achten, dass Kenacort A Orabase unmittelbar an den gewünschten Ort gebracht wird; ein späteres Verschieben ist nicht mehr möglich.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.



Welche Nebenwirkungen kann Kenacort-A Orabase haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Kenacort-A Orabase auftreten: in seltenen Fällen sind Hautveränderungen (Verdünnung der Haut, Erweiterung kleiner Hautgefässe, Hautstreifen, Akne) beobachtet worden. Treten solche Anzeichen bei Ihnen auf, informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Die Aufbrauchfrist nach Anbruch der Tube beträgt 6 Monate.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Tubengewinde nach Gebrauch reinigen und Tube fest verschliessen.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Kenacort-A Orabase enthalten?

Wirkstoff

1 g Kenacort-A Orabase, Paste zur Anwendung in der Mundhöhle enthält:

1 mg Triamcinolonacetonid

Hilfsstoffe

Carmellose-Natrium, Gelatine, Pektin, Polyethylen, dickflüssiges Paraffin (enthält all-rac- α -Tocopherol).

Zulassungsnummer

35039 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Kenacort-A Orabase? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Kenacort-A Orabase: Tube mit 5 g Paste zur Anwendung in der Mundhöhle.

Zulassungsinhaberin

Dermapharm AG, Hünenberg.

Diese Packungsbeilage wurde im Juli 2021 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

