

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

SWIDRO ARNICA-GEL MIT SPILANTHES, GEL

Pflanzliches Arzneimittel

Was ist Swidro Arnica-Gel mit Spilanthes und wann wird es angewendet?

Swidro Arnica-Gel mit Spilanthes ist ein kühlendes Gel, das rasch in die Haut einzieht und sich aufgrund des Zusammenwirkens von Auszügen aus Parakresse (*Spilanthes oleracea*), Arnikablüten und Arnikawurzeln zur Behandlung von stumpfen Sport- und Unfallverletzungen eignet. Traditionsgemäss wird Swidro Arnica-Gel mit Spilanthes verwendet zur Behandlung von nicht blutenden, stumpfen Sportverletzungen, wie Prellungen, Verstauchungen, Quetschungen, Zerrungen, kleineren Blutergüssen, von Sehnenscheidenentzündung und Schleimbeutelentzündungen, sowie bei Schmerzen der Muskeln, Sehnen und Bänder infolge von Überanstrengung.

Wann darf Swidro Arnica-Gel mit Spilanthes nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Swidro Arnica-Gel mit Spilanthes darf nicht auf offenen (blutenden) Wunden und auf Schleimhäuten verwendet werden. Swidro Arnica-Gel mit Spilanthes darf nicht bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe (insbesondere wenn Sie auf Arnikazubereitungen allergisch reagieren) und bei Patienten mit Neigung zu Allergien sowie bei Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen angewendet werden.

Dieses Arzneimittel enthält 456 mg Alkohol (Ethanol) pro 1g Gel. Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält 100 mg Propylenglycol pro 1g Gel.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogist, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Medikamente (auch selbstgekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Swidro Arnica-Gel mit Spilanthes während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Swidro Arnica-Gel mit Spilanthes?



Erwachsene: Swidro Arnica-Gel mit Spilanthos 4-5-mal täglich in dünner Schicht auf die betroffenen Stellen auftragen und trocknen lassen. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt verschriebene Dosierung.

Die Anwendung und Sicherheit von Swidro Arnica-Gel mit Spilanthos bei Kindern und Jugendlichen ist bisher nicht geprüft worden.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Swidro Arnica-Gel mit Spilanthos haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Swidro Arnica-Gel mit Spilanthos gelegentlich auftreten: allergische Hautreaktionen (Bläschenbildung). Diese verschwinden nach Absetzung des Präparates. Bei Fortbestehen der Hautreaktionen fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) aufbewahren.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bewahren Sie die Tube gut verschlossen auf.

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie keine Arzneimittel in das Abwasser oder den Hausmüll. Geben Sie abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten an einer Abgabestelle (z.B. Apotheke, Drogerie, Arztpraxis) oder an einer Sammelstelle zurück. Diese Massnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Swidro Arnica-Gel mit Spilanthos ist fettfrei, klebt und schmiert nicht, hinterlässt keine Flecken.

Was ist in Swidro Arnica-Gel mit Spilanthos enthalten?

1 g Gel enthält:

Wirkstoffe:

50 mg Fluidextrakt aus Arnikawurzeln (*Arnica montana* L., radix), Droge-Extraktionsmittel-Verhältnis 1:10, Auszugsmittel: Ethanol 86 % (m/m), 100 mg Fluidextrakt aus Arnikablüten (*Arnica montana* L., flos), Droge-Extraktionsmittel-Verhältnis 1:10, Auszugsmittel: Ethanol 63 % (m/m), 200 mg Fluidextrakt aus dem Kraut der Parakresse (*Spilanthos oleracea* L., herba), Droge-Extraktionsmittel-Verhältnis: 1:10, Auszugsmittel: Ethanol 62 % (m/m).



Hilfsstoffe:

Ethanol (456 mg), gereinigtes Wasser, Propylenglycol (E1520, 100 mg), Carbomere, Diisopropanolamin

Zulassungsnummer

56942 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Swidro Arnica-Gel mit Spilanthes? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Tuben zu 100 g

ZulassungsinhaberIn

Alpinamed AG, Roggwil TG (Domizil: 9306 Freidorf)

Diese Packungsbeilage wurde im Dezember 2021 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

