

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

metaheptachol, Gocce orali

Medicamento omeopatico

Quando si usa metaheptachol?

Secondo la concezione omeopatica metaheptachol può essere utilizzato per i disturbi cronici dell'area epatobiliare.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere metaheptachol.

Quando non si può assumere metaheptachol e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

In caso di disturbi persistenti, poco chiari o di recente insorgenza nella parte superiore dell'addome, nonché di malattie della colecisti e ittero, è necessario consultare un medico.

I reclami nei bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere chiariti da un medico, pertanto il medicinale può essere somministrato ai bambini di età inferiore ai 12 anni solo sotto controllo medico.

Questo medicamento contiene 210 mg di alcool (etanolo) per 30 gocce equivalenti a 266 mg/ml (34% p/v). La quantità di alcool contenuta in queste 30 gocce equivale a meno di 6 ml di birra o 3 ml di vino. La ridotta quantità di alcol all'interno del medicamento non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere metaheptachol durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare metaheptachol?

Salvo diversa prescrizione medica, gli adulti e gli adolescenti a partire dai 12 anni assumono 25-30 gocce 3 volte al giorno in un po' di liquido prima o dopo i pasti. Il farmaco può essere somministrato ai bambini sotto i 12 anni solo sotto controllo medico.



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere metaheptachol?

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con metaheptachol e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di metaheptachol. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Termine di consumo dopo l'apertura

Si conserva per 12 mesi dall'apertura.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene metaheptachol?

1 g di liquido contiene:

Principi attivi

Berberis vulgaris (HAB) D2 100 mg, Chelidonium majus (HAB) D2 100 mg, Lophophytum leandri (HAB) D6 30 mg, Picrasma excelsa, Quassia amara D2 (HAB) 100 mg, Silybum marianum (HAB) TM 10 mg.

Sostanze ausiliarie

Acqua purificata ed etanolo.

Contiene il 34% di alcol in volume.

1 g di liquido corrisponde a 40 gocce o 1,05 ml.

Numero dell'omologazione

51190 (Swissmedic)

Dove è ottenibile metaheptachol? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flacone contagocce da 50 ml e 100 ml.

Titolare dell'omologazione

metapharmaka GmbH, 6462 Seedorf

Indirizzo postale: metapharmaka GmbH, Oberer Baumgarten 9, 6466 Bauen

Fabbricante

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

