

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, des Apothekers oder des Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Blasosan, Tropfen zum Einnehmen

Tentan AG

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Blasosan angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei Blasenschwäche (bei Jugendlichen und im Alter), Harnträufeln, häufiger Harnabgang auch in der Nacht, Erschlaffung des Blasenschliessmuskels im Alter und Reizblase.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Blasenschwäche kann viele Ursachen haben:

Erkältungen, nervöse Störungen oder seelische Konflikte können solche Beschwerden auslösen. Bei wiederkehrenden oder mehrere Tage andauernden Beschwerden und wenn Fieber auftritt, ist ärztlicher Rat einzuholen.

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, ob Blasosan gleichzeitig angewendet werden darf.

Wann darf Blasosan nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Dieses Arzneimittel enthält 708.3 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosis mit 25 Tropfen entsprechend 425 mg/g (42,5 % m/m). Die Menge in 25 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 18 ml Bier oder 7 ml Wein. Es ist unwahrscheinlich, dass die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel Auswirkungen auf Erwachsene und Jugendliche hat. Die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel kann die Wirkungen anderer Arzneimittel verändern. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Wenn Sie alkoholabhängig sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Bei Kindern unter 12 Jahren wird Blasosan nicht angewendet.

Bei einer andauernden Verschlechterung oder fehlenden Besserung ist der Arzt oder die Ärztin aufzusuchen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen!

Darf Blasosan während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?



Aufgrund der bisherigen Erfahrung ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten.

Das Arzneimittel enthält 50 % V/V Alkohol. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Wie verwenden Sie Blasosan?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Allgemeine Regel: Nach 17.00 Uhr so wenig Flüssigkeit wie möglich aufnehmen und vor dem Schlafengehen die Blase entleeren.

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene etwa eine Stunde vor dem Schlafengehen 25 Tropfen unverdünnt einnehmen. Beim Dosieren der Tropfen die Flasche senkrecht halten.

In hartnäckigen Fällen morgens nochmals 25 Tropfen einnehmen. Blasosan kann während längerer Zeit verabreicht werden.

Bei Kindern unter 12 Jahren wird Blasosan nicht angewendet. Hinweis: Bei Jugendlichen sind die Globuli (ohne Alkohol) zu verwenden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt bzw. von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Blasosan haben?

Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Blasosan ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Für Blasosan sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Blasosan enthalten?

1 g Flüssigkeit enthält:

Wirkstoffe

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D11, Artemisia cina (Cina) (HAB) D5, Ferrum phosphoricum (HAB) D11, Sepia officinalis (HAB) D11, Acidum silicicum (Silicea) (HAB) D11, Arctostaphylos uva-ursi (Uva ursi) (HAB) D5, je 167 mg

Hilfsstoffe

Ethanol 96 % V/V (entsprechend 425 mg Ethanol), gereinigtes Wasser

Dieses Arzneimittel enthält 50 % V/V Alkohol.



1 g Flüssigkeit entspricht 15 Tropfen bzw. 1.09 ml.

Zulassungsnummer

54519 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Blasosan? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung

Packung zu 50 ml Tropfen zum Einnehmen

ZulassungsinhaberIn

Tentan AG, 4452 Itingen

Diese Packungsbeilage wurde im März 2023 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

PI080050/10.24

