

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Blasosan, gouttes buvables

Tentan AG

Médicament homéopathique

Quand Blasosan est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Blasosan peut être utilisé en cas d'incontinence (chez les adolescents et les personnes âgées), de gouttes retardataires, d'émission d'urine pendant la nuit aussi, de relâchement du sphincter urétral chez les personnes âgées et de vessie hyperactive.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'application indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

La faiblesse vésicale peut avoir de nombreuses causes:

Les refroidissements, les troubles nerveux ou les conflits psychiques peuvent figurer parmi les facteurs déclencheurs. En cas de troubles réguliers ou persistants, accompagnés de fièvre, la consultation d'un médecin s'impose.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste si Blasosan peut être utilisé simultanément.

Quand Blasosan ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Ce médicament contient 708,3 mg d'alcool (éthanol) par dose de 25 gouttes correspondant à 425 mg/g (42,5 % m/m). La quantité contenue dans 25 gouttes de ce médicament correspond à moins de 18 ml de bière ou 7 ml de vin. Il est improbable que la quantité d'alcool contenue dans ce médicament ait des effets sur les adultes et les adolescents. La quantité d'alcool contenue dans ce médicament peut modifier les effets d'autres médicaments. Si vous prenez d'autres médicaments, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Si vous êtes dépendant de l'alcool, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. Blasosan n'est pas utilisé chez les enfants de moins de 12 ans. En cas d'aggravation ou d'amélioration inexistante, il est également conseillé de consulter un médecin.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Blasosan peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse ou l'allaitement.



Le médicament contient de l'alcool à 50 % v/v. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Comment utiliser Blasosan?

Sauf indication contraire du médecin:

Règle générale: boire le moins possible après 17h00 et vider complètement la vessie avant de se coucher.

Adolescents dès 12 ans et adultes: une heure environ avant le coucher, avaler 25 gouttes non diluées. Tenir le flacon verticalement lors du dosage des gouttes.

En cas de persistance des symptômes, prendre encore une fois 25 gouttes le lendemain matin. Blasosan peut être administré durant un laps de temps prolongé.

Blasosan n'est pas utilisé chez les enfants de moins de 12 ans. Remarque: les adolescents doivent utiliser les globules (sans alcool).

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Blasosan peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Blasosan et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de Blasosan n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Conservation

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C). Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Blasosan?

1 g de liquide contient:

Principes actifs

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D11, Artemisia cina (Cina) (HAB) D5, Ferrum phosphoricum (HAB) D11, Sepia officinalis (HAB) D11, Acidum silicicum (Silicea) (HAB) D11, Arctostaphylos uva-ursi (Uva ursi) (HAB) D5, 167 mg chacun

Excipients

Éthanol à 96 % v/v (correspond à 425 mg d'éthanol), eau épurée

Ce médicament contient de l'alcool à 50 % v/v.

1 g de liquide correspond à 15 gouttes, resp. 1,09 ml.

Numéro d'autorisation

54519 (Swissmedic)



Où obtenez-vous Blasosan? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale

Emballage de 50 ml de gouttes buvables

Titulaire de l'autorisation

Tentan AG, 4452 Itingen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

PI080050/10.24

