

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal Suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del Suo medico, del Suo farmacista o del Suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Blasosan, gocce orali

Tentan AG

Medicamento omeopatico

Quando si usa Blasosan?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Blasosan gocce orali può essere usato in caso di incontinenza urinaria (nei giovani e negli anziani), leggere perdite di urina (sgocciolamenti), frequente perdita di urina anche di notte, rilassamento dello sfintere della vescica dovuto all'invecchiamento e vescica irritabile.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

L'incontinenza urinaria può avere molte cause:

malattie da raffreddamento, disturbi nervosi o conflitti psichici possono scatenare questi disturbi. In caso di recidiva o se i disturbi perdurano per vari giorni e se compare febbre, consultare un medico.

Se il Suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al Suo medico o al Suo farmacista o al droghiere se simultaneamente può assumere Blasosan.

Quando non si può assumere Blasosan e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Questo medicamento contiene 708,3 mg di alcool (etanolo) per dose da 25 gocce, corrispondenti a 425 mg/g (42,5% m/m). La quantità di alcool presente in 25 gocce di questo medicamento è inferiore al contenuto di alcool di 18 ml di birra o 7 ml di vino. È improbabile che la quantità di alcool in questo medicamento produca effetti negli adulti e negli adolescenti. La quantità di alcool contenuta in questo medicamento può modificare l'effetto di altri medicinali. Si rivolga al Suo medico o farmacista se assume altri medicinali. Se è incinta o allatta, si rivolga al Suo medico o farmacista prima di assumere questo medicamento.

Se è dipendente dall'alcool, si rivolga al Suo medico o farmacista prima di assumere questo medicamento.

Blasosan non è indicato per i bambini di età inferiore a 12 anni.

In caso di costante peggioramento o se non interviene un miglioramento, consultare il medico.

Informi il Suo medico, il Suo farmacista o il Suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Si può usare Blasosan durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento.



Questo medicamento contiene 50% v/v di alcool. Se è incinta o allatta, si rivolga al Suo medico o farmacista prima di assumere questo medicamento.

Come usare Blasosan?

Salvo diversa prescrizione del medico:

Regola generale: Dopo le 17:00 assumere la minor quantità di liquidi possibile e svuotare la vescica prima di coricarsi.

Adolescenti a partire dai 12 anni e adulti: assumere 25 gocce non diluite circa un'ora prima di coricarsi. Nel dosare le gocce tenere il flacone in posizione verticale.

Nei casi ostinati assumere nuovamente 25 gocce di Blasosan al mattino. Si può assumere Blasosan per periodi prolungati.

Blasosan non è indicato per i bambini di età inferiore a 12 anni. Nota: negli adolescenti usare i globuli (che non contengono alcool).

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal Suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al Suo medico, al Suo farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Blasosan?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Blasosan e informi il Suo medico o il Suo farmacista o il Suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Blasosan.

Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il Suo medico o il Suo farmacista o il Suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Blasosan?

1 g di liquido contiene:

Principi attivi

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D11, Artemisia cina (Cina) (HAB) D5, Ferrum phosphoricum (HAB) D11, Sepia officinalis (HAB) D11, Acidum silicicum (Silicea) (HAB) D11, Arctostaphylos uva-ursi (Uva ursi) (HAB) D5, ciascuno 167 mg

Sostanze ausiliarie

Etanolo 96% v/v (corrispondente a 425 mg di etanolo), acqua purificata

Questo medicamento contiene 50% v/v di alcool.

1 g di liquido corrisponde a 15 gocce, risp. a 1,09 ml.

Numero dell'omologazione

54519 (Swissmedic)



Dov'è ottenibile Blasosan? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica

Confezione da 50 ml di gocce orali

Titolare dell'omologazione

Tentan AG, 4452 Itingen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

PI080050/10.24

