

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Desomedin® DD

Bausch & Lomb Swiss AG

Qu'est-ce que Desomedin DD et quand doit-il être utilisé?

Desomedin DD est un collyre en solution contenant un principe actif antibactérien. Ce médicament est utilisé dans le traitement d'affections bactériennes de l'œil et de ses annexes, telles que conjonctivites, infections des paupières (orgerets) et des voies lacrymales.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou votre pharmacien pour traiter les troubles oculaires dont vous souffrez actuellement. Ne l'utilisez pas pour le traitement d'autres maladies ou d'autres personnes.

Remarque pour les porteurs de lentilles de contact: il ne faut pas porter de lentilles de contact pendant le traitement par Desomedin DD.

En cas de traitement concomitant par d'autres préparations oculaires, attendre 15 minutes entre les instillations.

Quand Desomedin DD ne doit-il pas être utilisé?

Desomedin DD ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité (allergie) connue ou supposée à l'un des composants de cette préparation ophtalmique.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Desomedin DD?

Si après 2–3 jours de traitement par Desomedin DD collyre en solution, vous constatez une aggravation de vos troubles oculaires ou l'apparition de nouveaux symptômes, consultez immédiatement votre médecin.

Une vision floue pouvant apparaître après l'utilisation de Desomedin DD, vous ne devez pas conduire ou utiliser de machines avant que votre vision ne soit redevenue nette.

Ce médicament contient 0,09 mg de bore par goutte, ce qui correspond à 2,188 mg/ml.

Ce médicament ne doit pas être administré à un enfant de moins de 2 ans sans avis médical, car il contient du bore et peut nuire à sa fertilité future.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments au niveau des yeux (même en automédication !).

Desomedin DD peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

N'utilisez ce produit pendant la grossesse qu'avec l'accord de votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Comment utiliser Desomedin DD?

Adultes: en général, 1 goutte de Desomedin DD est instillée dans l'œil 4 à 6 fois par jour. Évitez une utilisation prolongée ou répétée, car les bactéries peuvent développer des résistances. La durée du traitement ne devrait donc pas dépasser 8 jours.

L'utilisation et la sécurité de ce médicament chez les enfants et les adolescents n'ayant pas fait l'objet jusqu'à présent d'études systématiques, l'utilisation est déconseillée chez ces patients !



Lavez-vous soigneusement les mains avant l'utilisation. Afin de préserver la stérilité du médicament, ne touchez l'embout du compte-gouttes ni avec les mains ni avec l'œil, refermez la dose journalière immédiatement après usage et jetez-la à la fin de la journée.

Après l'instillation, fermez l'œil traité pendant environ 2 minutes tout en exerçant une légère pression avec l'index sur le coin interne de l'œil. Cela retarde l'écoulement du collyre vers le nez.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quels effets secondaires Desomedin DD peut-il provoquer?

L'utilisation de Desomedin DD peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Irritations transitoires des yeux, sensibilité des yeux et réactions allergiques. Les principes actifs contenus dans les préparations ophtalmiques peuvent passer dans la circulation sanguine. C'est pourquoi des effets secondaires dans le reste du corps sont aussi possibles. Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Ne pas utiliser plus de 30 jours après ouverture du sachet aluminium des 10 flacons unidoses.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C), dans l'emballage d'origine et hors de la portée des enfants. Après la fin du traitement, apporter le médicament à la personne qui vous l'a délivré (médecin ou pharmacien) en vue de son élimination conforme. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Que contient Desomedin DD?

1 ml Desomedin DD, collyre en solution contient:

Principes actifs

1 mg d'hexamidine di-isétionate.

Excipients

Chlorure de sodium, acide borique, borax, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

53037 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Desomedin DD? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Peut être remis sans ordonnance médicale en pharmacie par un pharmacien après un conseil spécialisé personnalisé.



Desomedin DD collyre en solution 10 × 0,6 ml (refermable).

Titulaire de l'autorisation

Bausch & Lomb Swiss AG, Zug.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

