

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento Le è stato prescritto dal Suo medico o Le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del Suo medico o del Suo farmacista, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Andursil®

Dr. Heinz Welti AG

Che cos'è Andursil e quando si usa?

L'Andursil neutralizza l'eccesso di acido presente nello stomaco e lenisce i disturbi che esso provoca, elimina gli eccessi di gas che si accumulano nello stomaco e nell'intestino, agisce contro la flatulenza e forma una pellicola che protegge la mucosa gastrica. Lo si usa in caso di disturbi a causa d'eccesso di acido e accumulazione di gas come bruciore di stomaco, senso di pressione o pienezza della regione gastrica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

A causa dello zucchero compresso nell'Andursil osservi l'igiene boccale normale per la profilassi della carie.

Avviso ai diabetici: Questo medicamento contiene 1,46 g di carboidrati digeribili per compressa da masticare.

Quando non si può assumere Andursil?

Non si può usare Andursil in presenza di gravi disturbi della funzionalità renale e in caso di ipersensibilità conosciuta a uno dei costituenti del preparato.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione dell'Andursil?

Se soffre di ulcera intestinale o dello stomaco, l'Andursil si può prendere solo su prescrizione del suo medico. E' possibile un influsso sull'effetto di altri medicinali, in particolare quello di certi farmaci per il cuore, di preparati a base di ferro, di antireumatici e di antibiotici del gruppo delle tetracicline. Se le sono prescritti medicinali di questo tipo non li prenda contemporaneamente all'Andursil, ma a distanza di almeno due ore e chiedi consiglio al medico. Se soffre di disturbi della funzionalità renale o di calcoli renali, l'Andursil si può prendere solo su prescrizione del suo medico.

Se i disturbi persistono per più di 2 settimane consulta il suo medico.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il medico, il farmacista o il droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Andursil durante la gravidanza o l'allattamento?

In gravidanza, ma anche se solo si desidera una gravidanza, si può usare Andursil esclusivamente dopo averne parlato col medico. Durante il periodo d'allattamento bisogna evitare la presa di Andursil.

Come usare Andursil?

Adulti: Secondo il bisogno, masticare lentamente una compressa circa 1 ora dopo i pasti.

Dosa massima giornaliera: 2 compresse.

L'utilizzo e la sicurezza di Andursil per i bambini non è stata finora provata sistematicamente.



Durata del trattamento

Senza consultare il medico si raccomanda una durata massima del trattamento di 2 settimane.

Come da tutti gli antiacidi, in caso di sintomi persistenti (più di due settimane), si raccomanda urgente di fare una diagnosi per escludere la presenza di una malattia grave.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Andursil?

Con l'uso di Andursil possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: possono manifestarsi stitichezza o diarrea. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C), nella confezione originale e al riparo dall'umidità.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Andursil?

Principi attivi

Per compressa da masticare: 750 mg di alluminio idrossido/magnesio carbonato (gel secco) e 250 mg di simeticone.

Sostanze ausiliarie

Saccharosio, silice colloidale anidra e aroma menta.

Numero dell'omologazione

38845 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Andursil? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica.

Compresse da masticare 24 e 100.

Titolare dell'omologazione

Dr. Heinz Welti SA, Gebenstorf.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

