

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gouttes Dr. Reckeweg® R1 Anginacid

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R1 Anginacid sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R1 Anginacid peuvent être utilisées en cas d'inflammations du cou et de la gorge.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R1 Anginacid peuvent être prises simultanément. En cas de fièvre élevée ou si dans le délai d'une semaine aucune amélioration n'est apparue, veuillez consulter un médecin.

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R1 Anginacid ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

Les gouttes Dr. Reckeweg® R1 Anginacid ne doivent pas être utilisées en cas d'allergie au venin d'abeille. Pour les petits enfants de moins de deux ans, n'utiliser que sur prescription médicale.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Les gouttes Dr. Reckeweg® R1 Anginacid peuvent-elles être prises/utilisées pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R1 Anginacid?

Sauf prescription contraire du médecin, en cas de troubles aigus, prendre 1 à 2 fois 10 à 15 gouttes dans un peu d'eau toutes les heures. Au bout d'une journée environ, réduire la dose à toutes les 1 à 2 heures jusqu'à amélioration définitive. Dans les cas chroniques, prendre au début 2 à 3 fois par jour de 10 à 15 gouttes dans un peu d'eau avant les repas, puis au bout de 14 jours, prendre 1 à 2 fois par jour de 10 à 15 gouttes sur une période assez longue. Les enfants en bas âge prennent de 3 à 5 gouttes, les enfants plus âgés prennent de 5 à 8 gouttes. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R1 Anginacid peuvent-elles provoquer?

Dans de rares cas, une réaction d'hypersensibilité peut se produire (allergie à apis). Dans ce cas, arrêter le traitement et consulter le médecin. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés



dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R1 Anginacid et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) et hors de portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien, ou votre droguiste. Les gouttes contiennent 35 % vol. d'alcool.

Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R1 Anginacid?

10 ml contiennent: Apis D4 1 ml, Belladonna D4 1 ml, Hepar sulfuris D12 1 ml, Kalium bichromicum D4 0,01 ml, Lachesis D12 1 ml, Mercurius sublimatus corrosivus D5 1 ml, Phytolacca D4 1 ml, eau et alcool comme excipients. Contient 35 % vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

45033

Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R1 Anginacid? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie sans ordonnance médicale. Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en 10/2006 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

