

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perchè contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica, in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R1 Anginacid

Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R1 Anginacid e quando si usano ?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R1 Anginacid trovano principalmente impiego in caso di angina e di infiammazioni della gola.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R1 Anginacid. In caso di febbre elevata o di assenza di miglioramento dopo una settimana consultare il medico.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R1 Anginacid e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

Non applicare le gocce Dr. Reckeweg® R1 Anginacid in caso d'ipersensibilità al veleno delle api.

Somministrare ai bambini di età inferiore ai due anni solo con prescrizione medica.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R1 Anginacid durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R1 Anginacid?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere in casi acuti 10-15 gocce, in poca acqua, ogni ½-1ora. Dopo un giorno somministrare 10-15 gocce ogni 1-2 ore fino a miglioramento definitivo. In casi cronici assumere inizialmente 10-15 gocce, in poca acqua, 2-3 volte al dì prima dei pasti; dopo il 14 giorno passare a 10-15 gocce 1-2 volte al dì per un periodo prolungato. Somministrare ai lattanti rispettivamente 3-5 gocce, ai bambini 5-8 gocce. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R1 Anginacid?

In rari casi si può verificare una reazione di ipersensibilità (allergia ad Apis). In questi casi interrompere il trattamento e consultare il medico. Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere. Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R1 Anginacid e informi il medico, il



farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico, farmacista o droghiere. Le gocce contengono alcool 35 % Vol.

Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R1 Anginacid?

10 ml contengono: Apis D4 1 ml, Belladonna D4 1 ml, Hepar sulfuris D12 1 ml, Kalium bichromaticum D4 0,01 ml, Lachesis D12 1 ml, Mercurius sublimatus corrosivus D5 1 ml, Phytolacca D4 1 ml e come eccipienti alcool e acqua. Contiene alcool 35 % Vol.

Numero dell'omologazione

45033

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R1 Anginacid? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia o presso droghisti senza ricetta medica. Flaconi di gocce da 50 ml.i

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 10/2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

