

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

CANDESARTAN CHEPLAPHARM

Che cos'è CANDESARTAN CHEPLAPHARM e quando si usa?

CANDESARTAN CHEPLAPHARM contiene come principio attivo il candesartan cilexetil. È indicato per la terapia della pressione del sangue troppo elevata (ipertensione arteriosa) negli adulti, nonché nei bambini e giovani di età compresa fra 1 e 17 anni, e per il trattamento della debolezza del muscolo cardiaco (insufficienza cardiaca) negli adulti. CANDESARTAN CHEPLAPHARM blocca in maniera specifica determinati siti di legame propri dell'organismo (i cosiddetti recettori dell'angiotensina II) e fa parte di un gruppo di medicinali denominati antagonisti recettoriali dell'angiotensina II. Il medicamento agisce dilatando i vasi sanguigni, abbassando, quindi, la pressione arteriosa e migliorando la funzione del cuore. Il suo medico può usare CANDESARTAN CHEPLAPHARM, per migliorare le prestazioni cardiache, in associazione con altri farmaci o in sostituzione di farmaci che non sono adatti a causa di effetti indesiderati. CANDESARTAN CHEPLAPHARM si può usare soltanto su prescrizione medica.

Quando non si può assumere CANDESARTAN CHEPLAPHARM?

CANDESARTAN CHEPLAPHARM non si può assumere in caso d'ipersensibilità conosciuta al principio attivo candesartan cilexetil o ad una delle sostanze ausiliarie, nei pazienti con gravi malattie del fegato e/o colestasi oppure durante la gravidanza e l'allattamento. CANDESARTAN CHEPLAPHARM non deve essere assunto dai bambini di età inferiore a 1 anno.

Non deve prendere CANDESARTAN CHEPLAPHARM se soffre di diabete mellito (tipo 1 o tipo 2), se la funzionalità renale è compromessa e se assume medicinali contenenti il principio attivo aliskiren per il trattamento dell'ipertensione (ad es. Rasilez®).

Lei non deve prendere CANDESARTAN CHEPLAPHARM se, in occasione di una precedente assunzione di medicinali anti-ipertensivi, ha avuto rigonfiamenti del viso, delle labbra, della lingua o della cavità orale (disturbi della deglutizione o della respirazione).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di CANDESARTAN CHEPLAPHARM?

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!

È particolarmente importante che informi il medico curante se soffre di una malattia ai reni o al fegato oppure in caso di assunzione contemporanea di determinati anticoagulanti.

Una particolare cautela deve essere osservata anche nei pazienti con malattie delle valvole cardiache.

Inoltre deve informare il suo medico se, insieme a CANDESARTAN CHEPLAPHARM, lei prende medicinali che possono far aumentare i livelli di potassio nel sangue (ad es. determinati diuretici come



diuretici risparmiatori di potassio, preparati a base di potassio, eparina), preparati a base di litio o se prende regolarmente analgesici contro i reumatismi (antinfiammatori non steroidei o inibitori della COX-2) o se prende di acido acetilsalicilico (principio attivo contenuto in Aspirina ed in altri analgesici).

Informi il suo medico se assume degli ACE-inibitori (medicamenti per il trattamento della pressione arteriosa elevata, quali ad esempio enalapril, lisinopril o ramipril). Informi il suo medico soprattutto se soffre di problemi renali causati dal diabete o se assume degli ACE-inibitori assieme a un medicamento del gruppo dei cosiddetti antagonisti recettoriali dei mineralcorticoidi (per il trattamento dell'insufficienza cardiaca, quali ad esempio lo spironolattone). Non è raccomandato l'uso di CANDESARTAN CHEPLAPHARM in associazione a medicinali che contengono il principio attivo aliskiren.

Informi il suo medico se dovesse notare dolori addominali, nausea, vomito o diarrea dopo l'assunzione di CANDESARTAN CHEPLAPHARM. Il medico deciderà in merito all'opportunità di proseguire il trattamento. Non sospenda di propria iniziativa l'assunzione di CANDESARTAN CHEPLAPHARM.

Prima di un intervento chirurgico, informi il suo medico o il suo dentista che sta prendendo CANDESARTAN CHEPLAPHARM. Se questo medicamento viene usato insieme a determinati anestetici, è possibile la comparsa di una caduta della pressione del sangue.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere CANDESARTAN CHEPLAPHARM durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è in gravidanza, se intende programmare una gravidanza o se sta allattando al seno, non deve prendere CANDESARTAN CHEPLAPHARM. È noto che medicinali simili, usati durante la gravidanza, possono recare danni al feto. Se dovesse restare incinta durante la somministrazione di CANDESARTAN CHEPLAPHARM informi immediatamente il medico, che deciderà se è il caso di sospendere il trattamento o no.

Come usare CANDESARTAN CHEPLAPHARM?

Il medico, in base a visite regolari, stabilirà la dose adatta al suo caso. È molto importante prendere CANDESARTAN CHEPLAPHARM tutti i giorni così come è stato prescritto dal medico.

CANDESARTAN CHEPLAPHARM può essere preso indipendentemente dai pasti. La cosa migliore è prendere le compresse sempre alla stessa ora, ad es. al mattino.

Le compresse CANDESARTAN CHEPLAPHARM sono divisibili ai fini del dosaggio di una dose parziale.

Ipertensione negli adulti

Per il trattamento dell'ipertensione sanguigna il dosaggio raccomandato è di 8 mg una volta al giorno. Se necessario, il medico può aumentare la dose a 16 mg una volta al giorno. Se dopo 4 settimane di trattamento con una dose giornaliera di 16 mg la riduzione della pressione sanguigna non è sufficiente, si può aumentare ulteriormente la dose fino a un massimo di 32 mg una volta al giorno.

Ipertensione nei bambini e nei giovani di età compresa fra 1 e 17 anni

Il medico determinerà il dosaggio esatto.



I bambini che non riescono a deglutire le compresse possono sospendere le compresse CANDESARTAN CHEPLAPHARM. Il medico potrà prescrivere una ricetta per una sospensione appositamente preparata.

Insufficienza cardiaca negli adulti

Per il trattamento dell'insufficienza cardiaca, la dose iniziale di CANDESARTAN CHEPLAPHARM è di solito pari a 4 mg una volta al giorno. In seguito la posologia verrà lentamente aumentata nello spazio di diverse settimane fino a un massimo di 32 mg una volta al giorno. È importante seguire esattamente la prescrizione del medico.

Non è stata dimostrata l'efficacia nei bambini e nei giovani con insufficienza cardiaca. CANDESARTAN CHEPLAPHARM non deve essere quindi assunto da bambini e giovani con insufficienza cardiaca.

Nei pazienti anziani o nei pazienti con insufficienza renale o epatica da lieve a moderata non è necessario alcun aggiustamento della dose. Se soffre di una malattia renale grave, il suo medico potrebbe prescrivere un dosaggio iniziale più basso.

Non esiste alcuna esperienza sull'uso di CANDESARTAN CHEPLAPHARM nei bambini al di sotto di 1 anno di età.

Se dovesse aver preso più della dose prescritta, consulti immediatamente il medico curante o il farmacista. Se si è dimenticata di prendere una compressa, la prenda più tardi, non appena se ne sarà ricordata. Tuttavia, se è quasi giunto il momento di prendere la compressa successiva, allora non assuma la compressa di cui si era dimenticata.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere CANDESARTAN CHEPLAPHARM?

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Infezioni delle vie respiratorie, stati di annebbiamento e vertigini, mal di testa, dolori alla schiena e abbassamento della pressione arteriosa (frequentemente nei pazienti con insufficienza cardiaca).

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10'000)

Rigonfiamenti della pelle (soprattutto a carico del viso, delle labbra, della lingua, degli occhi) e/o delle mucose (angioedema), prurito o orticaria: In questo caso lei deve sospendere immediatamente l'assunzione di CANDESARTAN CHEPLAPHARM e rivolgersi al medico.

Vertigini, tosse, nausea, malattie del fegato (ad es. epatiti), eruzioni cutanee, orticaria, prurito, riduzione della funzionalità renale, dolori articolari e dolori muscolari nonché angioedema intestinale (un rigonfiamento dell'intestino con sintomi quali dolori addominali, nausea, vomito e diarrea).

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Febbre, accelerazione delle pulsazioni, cardiopalmo, dolori toracici, angina pectoris (sintomi come dolori nella gabbia toracica e/o nella regione della spalla e del braccio, difficoltà di respirazione), infarto cardiaco, formicolii a carico delle mani e dei piedi, sangue dal naso, stati ansiosi, depressione, difficoltà di respirazione e accumulo di acqua nei tessuti, acufeni (tinnito).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.



Di che altro occorre tener conto?

Non conservare a temperatura superiore ai 30 °C.

Tenere fuori della portata dei bambini.

Questo medicamento non deve essere utilizzato oltre la data di scadenza indicata sul contenitore.

Se fosse in possesso di medicinali scaduti, li riporti in farmacia per l'eliminazione.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene CANDESARTAN CHEPLAPHARM?

Principi attivi

Una compressa di CANDESARTAN CHEPLAPHARM contiene 4 mg, 8 mg, 16 mg o 32 mg di candesartan cilexetil.

Sostanze ausiliarie

Compressa di 4 mg: Carmellosa calcio, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, amido di mais, macrogol 8000, lattosio monoidrato.

Compresse da 8 mg, 16 mg e 32 mg: Carmellosa calcio, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, amido di mais, macrogol 8000, lattosio monoidrato, ossido di ferro (E172).

Numero dell'omologazione

62569 (Swissmedic)

Dove è ottenibile CANDESARTAN CHEPLAPHARM? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

CANDESARTAN CHEPLAPHARM 4 mg: confezioni da 7 compresse (con linea di frattura, divisibili)

CANDESARTAN CHEPLAPHARM 8 mg: confezioni da 28 e 98 compresse (con linea di frattura, divisibili)

CANDESARTAN CHEPLAPHARM 16 mg: confezioni da 28 e 98 compresse (con linea di frattura, divisibili)

CANDESARTAN CHEPLAPHARM 32 mg: confezioni da 28 e 98 compresse (con linea di frattura, divisibili)

Titolare dell'omologazione

CHEPLAPHARM Schweiz GmbH, 4102 Binningen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

