

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Beloc ZOK® 25/ 50/ 100/ 200

Che cos'è Beloc ZOK e quando si usa?

Beloc ZOK contiene metoprololo come principio attivo. Il metoprololo appartiene al gruppo dei beta-bloccanti ed è usato per trattare l'ipertensione (pressione sanguigna alta), per il trattamento a lungo termine dell'angina pectoris (stretta del cuore), dell'insufficienza cardiaca cronica, di aritmie cardiache (alterazioni del ritmo cardiaco) e disturbi cardiovascolari con palpitazioni. Inoltre, può essere utilizzato per la profilassi dell'emicrania.

Grazie alla speciale formulazione a rilascio controllato del principio attivo, l'effetto di Beloc ZOK compresse a rilascio prolungato dura di solito 24 ore.

Su prescrizione medica.

Quando non si può assumere/usare Beloc ZOK?

Beloc ZOK non deve essere assunto in caso di ipersensibilità nota al principio attivo metoprololo, a una delle sostanze ausiliarie o ad altri medicinali del gruppo dei beta-bloccanti.

Inoltre, Beloc ZOK non deve essere assunto:

- se presenta disturbi di conduzione dell'impulso dagli atri ai ventricoli (blocco AV di grado II e III),
- se ha un battito cardiaco irregolare che spesso è molto lento e a volte molto veloce (a meno che non abbia un pacemaker permanente),
- se presenta disturbi di conduzione dell'impulso tra il nodo senoatriale e l'atrio,
- se soffre di shock,
- se ha un'insufficienza della prestazione cardiaca associata ad accumulo di acqua nei polmoni, a una riduzione della circolazione sanguigna o a una bassa pressione sanguigna,
- se il suo polso a riposo prima del trattamento è inferiore a 50 battiti al minuto,
- se ha una pressione sanguigna patologicamente bassa,
- se la sua circolazione sanguigna nelle braccia o nelle gambe è fortemente ridotta,
- se è soggetto ad asma bronchiale o contrazioni della muscolatura bronchiale.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Beloc ZOK?

In caso di trattamento contemporaneo con medicinali per le malattie respiratorie, il dosaggio dei vari medicinali deve essere riaggiustato dal medico.

È richiesta cautela in caso di diabete, determinate malattie cardiache, disturbi di conduzione dell'impulso cardiaco, disturbi circolatori, funzionalità del fegato compromessa e nei pazienti con un tumore che produce ormoni (feocromocitoma).



Prima di un intervento chirurgico, l'anestesista deve essere informato dell'uso di Beloc ZOK.

Diversi altri medicinali (tra cui gocce nasali e gocce oculari) e l'alcol possono influire sull'effetto di Beloc ZOK se assunti contemporaneamente.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa a rilascio prolungato, cioè è essenzialmente «senza sodio».

Questo medicinale può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente

Si può assumere/usare Beloc ZOK durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta o desidera una gravidanza, così come se sta allattando, Beloc ZOK deve essere assunto solo previa consultazione con il suo medico.

Beloc ZOK, un beta-bloccante, può danneggiare il feto o causare un travaglio pretermine.

Come usare Beloc ZOK?

Le compresse a rilascio prolungato di Beloc ZOK devono essere assunte una volta al giorno con un bicchiere d'acqua. Possono essere assunte indipendentemente dai pasti. Le compresse a rilascio prolungato di Beloc ZOK hanno una linea di frattura e possono essere facilmente divise. Non devono però essere masticate o schiacciate.

Il medico determinerà il dosaggio giusto per lei sulla base di esami regolari. Di solito si applicano le seguenti linee guida di dosaggio:

Iperensione (pressione sanguigna alta)

Adulti

Per un'ipertensione lieve o moderata, assumere 1 compressa a rilascio prolungato di Beloc ZOK 50 una volta al giorno al mattino. Il dosaggio potrà essere aumentato dal medico a 1 compressa a rilascio prolungato di Beloc ZOK 100 o Beloc ZOK 200. Se necessario, il medico le prescriverà anche un altro medicinale per l'ipertensione.

Bambini e adolescenti (6-16 anni)

Per i bambini a partire dai 6 anni il dosaggio dipende dal peso corporeo. Il medico stabilirà il dosaggio corretto per suo figlio e lo controllerà regolarmente.



L'uso di Beloc ZOK nei bambini di età inferiore ai 6 anni non è raccomandato.

Angina pectoris (stretta del cuore)

Per l'angina pectoris, assumere 1 compressa a rilascio prolungato di Beloc ZOK 100 o Beloc ZOK 200 una volta al giorno. Se necessario, la dose potrà essere ulteriormente aumentata dal medico.

Insufficienza cardiaca cronica

Nell'insufficienza cardiaca cronica come terapia iniziale: Beloc ZOK 25 mg una volta al giorno per 2 settimane.

In caso di insufficienza cardiaca grave, per iniziare la terapia il medico potrà prescrivere una dose inferiore da 12,5 mg (1/2 compressa a rilascio prolungato di Beloc ZOK da 25 mg) una volta al giorno. La dose potrà poi essere raddoppiata ogni due settimane, fino a 200 mg di Beloc ZOK una volta al giorno.

Aritmie cardiache (alterazioni del ritmo cardiaco)

Per le aritmie cardiache, assumere 1 compressa a rilascio prolungato di Beloc ZOK 100 o Beloc ZOK 200 una volta al giorno. Se necessario, la dose potrà essere ulteriormente aumentata dal medico.

Disturbi cardiovascolari con palpitazioni

Per disturbi cardiovascolari, assumere 1 compressa a rilascio prolungato di Beloc ZOK 100 una volta al giorno. Se necessario, la dose potrà essere ulteriormente aumentata dal medico.

Profilassi dell'emicrania

Per la profilassi dell'emicrania, assumere 1 compressa a rilascio prolungato di Beloc ZOK 100 o Beloc ZOK 200 una volta al giorno.

Beloc ZOK non deve essere interrotto improvvisamente in nessun caso. Il medico determinerà il dosaggio da diminuire gradualmente.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Beloc ZOK?

In seguito all'assunzione di Beloc ZOK possono insorgere i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di 1 utilizzatore su 10)

Stanchezza

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)



Vertigini, mal di testa, nausea, mal di pancia, difficoltà a respirare, polso notevolmente lento, mani e piedi freddi, diarrea e costipazione

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

Condizioni di spossatezza, vomito, dolori nella zona del cuore, edema (accumulo di acqua nei tessuti), crampi muscolari, sonnolenza, insonnia, incubi, diminuzione dell'attenzione, depressione, aumento della sudorazione, eruzioni cutanee, attacchi d'asma e aumento di peso

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

Palpitazioni, battito cardiaco irregolare, insufficienza cardiaca, nervosismo, ansia, disturbi visivi, occhi secchi e irritati, infiammazione della mucosa nasale, debolezza muscolare, bocca secca, perdita di capelli, disturbi della libido e della potenza erettile

Molto raro (riguarda 1 utilizzatore su 10'000)

Sbalzi emotivi, disturbi della memoria, confusione, allucinazioni, ronzio nelle orecchie, alterazioni del gusto, aumento della sensibilità della pelle alla luce, peggioramento della psoriasi e dolori articolari

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30°C e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il suo medico o il suo farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Beloc ZOK?

1 compressa a rilascio prolungato di Beloc ZOK 25, 50, 100 o 200 contiene:

Principi attivi

23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg e 190 mg di metoprololo succinato (corrispondenti rispettivamente a 25 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg di metoprololo tartrato)

Sostanze ausiliarie

Silice colloidale, etilcellulosa, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato, idrossipropilmetilcellulosa, glicole polietilenico, titanio diossido e paraffina

Contenuto totale di sodio per compressa a rilascio prolungato:

Beloc ZOK 25: 0,014 mg

Beloc ZOK 50: 0,018 mg

Beloc ZOK 100: 0,029 mg



Beloc ZOK 200: 0,059 mg

Numero dell'omologazione

52110 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Beloc ZOK? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Beloc ZOK 25 mg: 30 e 100 compresse a rilascio prolungato

Beloc ZOK 50 mg: 30 e 100 compresse a rilascio prolungato

Beloc ZOK 100 mg: 30 e 100 compresse a rilascio prolungato

Beloc ZOK 200 mg: 30 e 100 compresse a rilascio prolungato

Titolare dell'omologazione

Recordati AG, 4057 Basel

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

