

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gaspan, capsule gastroresistenti

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Gaspan e quando si usa?

Gaspan è un medicamento fitoterapeutico e contiene una miscela di olio di menta piperita e olio di cumino. Gaspan viene impiegato in caso di gonfiore, sensazione di oppressione e pienezza addominale con lievi crampi. Le capsule sono rivestite da una pellicola protettiva gastroresistente, che impedisce il rilascio prematuro di olio di menta piperita o di olio di cumino nello stomaco.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Assumere le capsule fino a quando i sintomi non migliorano. I disturbi gastrointestinali possono essere segni di malattie che richiedono l'accertamento e il trattamento medico. Quindi, in caso di disturbi della durata di oltre 1 settimana o periodicamente ricorrenti, il trattamento non va effettuato senza il parere del medico.

Quando non si può assumere Gaspan e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- In caso di ipersensibilità al principio attivo o a uno degli altri componenti
- In presenza di malattie del fegato, calcoli biliari e malattie infiammatorie delle vie biliari (colangite) o altre malattie delle vie biliari
- Nei pazienti con insufficiente quantità di acidi nel succo gastrico (acloridria)

Gaspan non va usato nei bambini sotto i 12 anni.

Questo medicamento contiene sorbitolo. Se soffre di un'intolleranza a determinati zuccheri, chieda consiglio al medico prima di prendere Gaspan.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere Gaspan durante la gravidanza o l'allattamento?

La sicurezza durante la gravidanza e l'allattamento non è stata sufficientemente studiata. Di conseguenza, l'uso non è raccomandato durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Gaspan?

Gli adulti e gli adolescenti dai 12 anni d'età assumono 1 capsula 2 volte al giorno, senza masticarla, con abbondanti liquidi (es. 1 bicchier d'acqua) e almeno 30 minuti prima di un pasto, possibilmente di mattina e a mezzogiorno. Può assumere le capsule anche senza consumare un pasto successivamente.



Gaspan non va usato nei bambini sotto i 12 anni.

Le capsule vanno ingerite intere, cioè non danneggiate o masticate, in modo che il principio attivo non venga rilasciato troppo presto. Il rilascio anticipato del principio attivo può causare un'irritazione locale della bocca e dell'esofago.

Per prevenire una dissoluzione anticipata del rivestimento gastroresistente, Gaspan va assunto

- almeno 30 minuti prima dei pasti,
- almeno un'ora prima o dopo l'uso di altri medicinali utilizzati per ridurre la produzione di acidi gastrici.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Gaspan?

Possono comparire disturbi gastrointestinali, quali eruttazione, bruciori di stomaco, nausea, vomito o prurito anale. Inoltre possono comparire delle reazioni allergiche. La loro frequenza non è nota. Se compaiono segni di una reazione allergica, sospendere Gaspan e rivolgersi a un medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

L'assunzione fino a 3 capsule come singola dose o fino a 8 capsule al giorno non causa, di regola, sintomi da sovradosaggio. In seguito all'assunzione di grandi quantità, gli effetti collaterali possono essere più intensi. In questo caso, sospendere immediatamente il medicamento e consultare subito un medico. In caso di sovradosaggio, non va mai causato il vomito e non si deve assumere latte o alcool.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Gaspan?

1 capsula gastroresistente contiene:

Principi attivi

90 mg di olio di menta piperita e 50 mg di olio di cumino.

Sostanze ausiliarie

Polisuccinato di gelatina; glicerolo 85%; polisorbato 80; glicole propilenico; glicerolo monostearato 40-55; acido metacrilico-metile metacrilato copolimero (1:1) (Ph. Eur.); trigliceridi a catena media; sodio laurilsolfato; sorbitolo (Ph. Eur.); diossido di titanio (E 171); ferro(III) ossido giallo x H₂O (E 172); blu patentato V (E 131) e giallo di chinolina (E 104).

Numero dell'omologazione

67127 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Gaspan? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.



Confezioni da 28 e da 42 capsule.

Titolare dell'omologazione

Schwabe Pharma AG
Erlistrasse 2
6403 Küssnacht am Rigi

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2019 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

