

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perchè contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica, in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico o del farmacista al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R12 Jodin.

Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R12 Jodin e quando si usano?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R12 Jodin trovano principalmente impiego in caso di disturbi conseguenti all'arteriosclerosi.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R12 Jodin.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R12 Jodin e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

In caso di affezioni della tiroide, consultare il medico prima dell'uso (Kalium iodatum in D3). Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R12 Jodin durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R12 Jodin?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere 10-15 gocce, in poca acqua, 3-6 volte al giorno prima dei pasti. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R12 Jodin?

In rari casi possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità allo iodio. Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R12 Jodin e informi il suo medico o farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15 - 25° C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista. Le gocce contengono alcool 35 % Vol.

Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R12 Jodin ?



10 ml contengono: Arnica montana D3 1 ml, Barii chloridum D4 1 ml, Conium maculatum D5 1 ml, Kalii iodidum D3 1 ml, Nitroglycerinum (Glonoinum) D6 1 ml, Phosphorus D5 1 ml, Plumbi (II) acetate D6 1 ml e come eccipiente alcool e acqua. Contiene alcool 35 % vol.

Numero dell'omologazione

45042

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R12 Jodin? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia senza ricetta medica. Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 09/2005 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

