

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Urocit®

Qu'est-ce que Urocit et quand doit-il être utilisé?

Certaines maladies et certains traitements entraînent une augmentation de l'excrétion de l'acide urique dans les urines, provoquant ainsi la formation de calculs urinaires. Urocit est utilisé pour rendre l'urine moins acide et prévenir la formation de nouveaux calculs urinaires.

Sur prescription de votre médecin.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Les comprimés sont à prendre sans les croquer pendant ou après le repas avec beaucoup de liquide.

Quand Urocit ne doit-il pas être pris/utilisé?

Si vous présentez les maladies ou symptômes suivants, vous ne devez pas prendre Urocit: augmentation du taux de potassium dans le sang (hyperkaliémie), troubles de la fonction rénale, insuffisance rénale, rétention urinaire, diabète sucré non contrôlé, troubles de l'équilibre hydrique (déshydratation), troubles de la fonction des glandes surrénales (p. ex. maladie d'Addison non traitée), destruction tissulaire étendue, activité physique très intense, en particulier chez des personnes non entraînées, ulcères gastro-intestinaux, rétrécissement (sténose) du tube digestif ou motilité gastro-intestinale fortement réduite à la suite de certaines maladies ou de certains traitements (ralentissement du transit intestinal ou troubles de la vidange gastrique), traitement concomitant par des anticholinergiques (médicaments qui diminuent l'effet de l'acétylcholine, une substance produite par l'organisme, p. ex. l'atropine). Les patients présentant une infection active des voies urinaires ne doivent pas non plus recevoir Urocit.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation d'Urocit?

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie, en particulier d'une maladie cardiaque ou de crampes musculaires (myotonie congénitale, maladie de Thomsen),
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Certains médicaments peuvent augmenter la concentration de potassium dans le sang et ainsi favoriser la survenue d'une hyperkaliémie.

Médicaments influençant le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA):

Il s'agit par exemple des inhibiteurs de l'ECA (utilisés contre l'hypertension), des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, des diurétiques épargneurs de potassium (notamment la spironolactone, le triamtérène, l'amiloride ou l'éplénérone) ainsi que de l'aliskirène (un médicament



contre l'hypertension). Ces médicaments peuvent entraîner une augmentation de la rétention du potassium dans l'organisme. Dans ces situations, le taux de potassium doit être étroitement surveillé.

Analgésiques et anti-inflammatoires (AINS):

Certains médicaments contre la douleur et l'inflammation, comme l'acide acétylsalicylique, l'ibuprofène ou le diclofénac (appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens), peuvent augmenter la concentration de potassium dans le sang. Dans ces situations, le taux de potassium doit être étroitement surveillé.

Les médicaments qui ralentissent le transit gastro-intestinal (tels que les anticholinergiques) peuvent augmenter le risque d'irritation du tractus gastro-intestinal.

En raison du risque d'augmentation du taux de potassium dans le sang (hyperkaliémie), la prudence est de rigueur chez les patients cardiaques présentant des troubles de l'excrétion du potassium. Il convient en outre d'éviter toute administration d'Urocit aux patients présentant des troubles de la fonction rénale ou, de manière générale, des troubles de l'excrétion du potassium.

En cas de vomissements sévères, de maux de ventre ou de saignements gastro-intestinaux, il faut immédiatement interrompre le traitement par Urocit et effectuer des examens appropriés.

Le citrate contenu dans ce médicament peut augmenter l'absorption de l'aluminium en cas de prise concomitante de médicaments ou de produits contenant de l'aluminium (p. ex. certains médicaments contre les brûlures d'estomac). Il est donc recommandé de respecter un intervalle de deux heures minimum entre la prise d'Urocit et celle de telles préparations.

À ce jour, rien n'indique que l'utilisation d'Urocit conformément aux prescriptions puisse altérer la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

Ce médicament contient 10,6 mmol (ou 413,4 mg) de potassium par comprimé. Cette quantité doit être prise en compte si vous souffrez d'une insuffisance rénale ou si vous devez suivre un régime dans lequel le potassium doit être contrôlé (régime avec une faible teneur en potassium).

Urocit peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

La prudence est de rigueur lors de la prise d'Urocit pendant la grossesse et l'allaitement. Urocit ne doit être pris qu'en accord avec le médecin et conformément à la prescription.

Comment utiliser Urocit?

La posologie est déterminée individuellement pour chaque patient. Suivez scrupuleusement les instructions de votre médecin.

La dose journalière prescrite doit être répartie en 2 à 3 prises, à prendre pendant ou après les repas.

Posologie usuelle

Pour neutraliser l'urine: 3 à 6 comprimés par jour à répartir en 2 à 3 prises, à raison de 1 à 2 comprimés par prise.

L'utilisation et la sécurité d'Urocit n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents. Les comprimés Urocit sont à prendre sans les croquer pendant ou après le repas avec beaucoup de liquide.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.



Quels effets secondaires Urocit peut-il provoquer?

La prise d'Urocit peut provoquer les effets indésirables suivants:

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Troubles et irritations du tractus gastro-intestinal tels que flatulences, maux de ventre, nausées, vomissements, diarrhées. L'apparition de troubles gastro-intestinaux peut généralement être évitée en prenant les comprimés avec suffisamment de liquide, au cours d'un repas, ou en diminuant la dose.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Réactions d'hypersensibilité telles que démangeaisons, éruption cutanée, urticaire.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000)

Affections du tractus gastro-intestinal telles que rétrécissement ou occlusion (obstruction), hémorragies ou ulcères avec ou sans perforation du tractus gastro-intestinal supérieur ou inférieur.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver Urocit à température ambiante (15–25 °C), dans l'emballage d'origine et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

La matrice de cire des comprimés d'Urocit est destinée à ralentir la libération du principe actif. Après la libération du principe actif, cette matrice insoluble est excrétée dans les selles.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Urocit?

1 comprimé d'Urocit contient:

Principes actifs

1 080 mg (10 mEq) de citrate de potassium

Excipients

Cire de carnauba, stéarate de magnésium

Numéro d'autorisation

61884 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Urocit? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.



Emballages de 100 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

Recordati AG, 4057 Basel

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

