

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel anwenden. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie sollten es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte das Arzneimittel ihnen schaden. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Cerivikehl® D3, Injektionslösung

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Cerivikehl® D3, Injektionslösung angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Cerivikehl® D3, Injektionslösung auf Verschreibung Ihres Arztes oder Ihrer Ärztin bei Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege und Bronchitis angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Cerivikehl® D3, Injektionslösung gleichzeitig angewendet werden darf.

Wann darf Cerivikehl® D3, Injektionslösung nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht anwenden. Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf Cerivikehl® D3, Injektionslösung während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Cerivikehl® D3, Injektionslösung?

Dosierung/Anwendung für Erwachsene:

1 - 3 mal täglich 2 mL langsam intramuskulär, intravenös, subkutan oder intrakutan injizieren.

Die Anwendung und Sicherheit von Cerivikehl® D3, Injektionslösung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wurde bisher nicht geprüft

Welche Nebenwirkungen kann Cerivikehl® D3, Injektionslösung haben?



Für Cerivikehl® D3, Injektionslösung sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin informieren. Bei Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Cerivikehl® D3, Injektionslösung ab und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit „verwendbar bis.“ bezeichneten Datum verwendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Raumtemperatur (15-25°C) aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin.

Was ist in Cerivikehl® D3, Injektionslösung enthalten?

1 Ampulle zu 2 mL enthält:

2 mL Cetraria islandica D3 aquos. dilutio (HAB; 4a) Dieses Präparat enthält Natriumchlorid als zusätzlichen Hilfsstoff.

Zulassungsnummer

50207 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Cerivikehl® D3, Injektionslösung? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Packungen zu 10 und 50 Ampullen,

ZulassungsinhaberIn

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Diese Packungsbeilage wurde im Januar 2004 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

