

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Débridat® 100

Qu'est-ce que Débridat 100 et quand doit-il être utilisé ?

Débridat 100 est un médicament utilisé selon prescription du médecin.

La trimébutine, principe actif du Débridat 100, a la propriété de modifier les mécanismes qui interviennent dans le fonctionnement musculaire de l'appareil digestif. C'est pourquoi elle exerce un effet bénéfique sur les manifestations douloureuses du tube digestif, sur les troubles du transit et les ballonnements au cours des colopathies fonctionnelles (perturbations du bon fonctionnement du côlon).

Quand Débridat 100 ne doit-il pas être pris ?

Débridat 100 ne devra pas être pris dans le cas où votre médecin a mis en évidence une réaction allergique au produit lors d'une utilisation précédente.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Débridat 100 ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe) (même en automédication !).

Débridat 100 peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Bien que des effets nocifs pour la femme enceinte ou l'enfant n'aient pas été rapportés depuis la commercialisation du produit, les expériences sont limitées. Il est donc recommandé d'éviter le Débridat 100 pendant les trois premiers mois de grossesse. Pendant les autres trimestres, le produit ne doit être utilisé que si cela est clairement nécessaire.

Il conviendra d'éviter l'administration de Débridat 100 pendant l'allaitement.

Comment utiliser Débridat 100 ?

Chez l'adulte: 1 à 2 comprimés pelliculés 3× par jour avant les repas.

L'utilisation et la sécurité de Débridat 100 n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Débridat 100 peut-il provoquer ?



L'utilisation de Débridat 100, comprimés pelliculés peut entraîner les effets secondaires ci-après.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Réactions cutanées.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien si vous possédez des comprimés pelliculés dont la date de péremption est échue et rapportez-les à votre pharmacien pour une élimination correcte.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Débridat 100 ?

1 comprimé pelliculé contient

Principes actifs

100 mg maléate de trimébutine.

Excipients

Lactose monohydraté, amidon de maïs prégélatinisé, hypromellose, carboxyméthylamidon sodique (type A), acide tartrique, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium, macrogol 4000, dioxyde de titane.

Numéro d'autorisation

45427 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Débridat 100 ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Boîte de 30 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'autorisation

F.Uhlmann-Eyraud SA, 5600 Lenzburg.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

