

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo perché contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin

Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin e quando si usano?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin trovano principalmente impiego in caso di disturbi della digestione.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

I disturbi digestivi nei bambini di età inferiore ai 12 anni richiedono una diagnostica medica. Per questo motivo non si può somministrare il prodotto ai bambini di età inferiore ai 12 anni senza consultare un medico. Non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin in caso di ipersensibilità al veleno delle api.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, suo farmacista o al suo droghiere.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere 10-15 gocce, in poca acqua, 3-4 volte al giorno prima dei pasti. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista, o droghiere. Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin e informi il suo medico, farmacista o droghiere.

Di che altro occorre tener conto?



Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15 - 25 °C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico, farmacista o droghiere. Le gocce contengono alcool 35 % Vol.

Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin?

10 ml contengono: Apis D5 2 ml, Colocynthis D6 2 ml, Lycopodium D6 2 ml, Momordica balsamina D3 2 ml, Phosphorus D6 2 ml. Contiene alcool 35 % vol.

Numero dell'omologazione

45099

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R72 Pankropatin? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 09/2005 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

