

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes oder des Apothekers bzw. der Ärztin oder Apothekerin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Ginkgobakehl TM, Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Ginkgobakehl TM, Tropfen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Ginkgobakehl TM, Tropfen bei Kopfschmerzen mit Beschwerden wie Benommenheit, Konzentrationsmangel und Müdigkeit angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Ginkgobakehl TM, Tropfen gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf Ginkgobakehl TM, Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Ginkgobakehl TM, Tropfen darf bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden (Alkoholgehalt).
- Ginkgobakehl TM, Tropfen darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Ginkgo biloba nicht angewendet werden.
- Ginkgobakehl TM, Tropfen muss bei Patientinnen und Patienten mit erhöhter Blutungsneigung mit Vorsicht angewendet werden (erhöhtes Blutungsrisiko).
- Ginkgobakehl TM, Tropfen sollte (gemäss allgemeiner medizinischen Praxis) mindestens 2 Wochen vor jeder Operation nicht mehr angewendet werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Die Tropfen enthalten 66 Vol-% Alkohol.

Darf Ginkgobakehl TM, Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.



Wie verwenden Sie Ginkgobakehl TM, Tropfen?

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben, nehmen Erwachsene 3 - 5 mal täglich ca. 10 – 15 Tropfen. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Ginkgobakehl TM, Tropfen haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Ginkgobakehl TM, Tropfen auftreten: Sehr selten leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopf schmerzen oder allergische Hautreaktionen (Hautrötung, -schwellung, Juckreiz). In solchen Fällen ist die Behandlung zu unterbrechen und ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Aufgrund der in Ginkgobakehl TM, Tropfen enthaltenen Ginkgo-Urtinktur kann eine Wechselwirkung mit Arzneimitteln, die die Blutgerinnung hemmen, nicht ausgeschlossen werden. Bei gleichzeitiger Anwendung von blutgerinnungshemmenden Mitteln sowie bei Patientinnen und Patienten mit erhöhter Blutungsneigung kann das Blutungsrisiko erhöht sein. Gemäss allgemeiner medizinischer Praxis ist es ratsam, auf die Einnahme von Ginkgobakehl TM, Tropfen mindestens 2 Wochen vor jeder Operation zu verzichten. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Ginkgobakehl TM, Tropfen ab und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit „verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden. Die Tropfen enthalten 66 % V/V Alkohol. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Raumtemperatur (15-25°C) und vor Licht geschützt aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin.

Was ist in Ginkgobakehl TM, Tropfen enthalten?

Die Lösung enthält:

Ginkgo biloba e foliis siccatis TM (HAB, 4a) entspr. 66 % V/V Alkohol.

Zulassungsnummer

50189 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Ginkgobakehl TM, Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen zu 30 mL und 100 mL.

Zulassungsinhaber

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach



Diese Packungsbeilage wurde im Juli 2004 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

