

## **Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

## **neotylol Muco**

**NOBEL Pharma Schweiz AG**

### ***Che cos'è neotylol Muco e quando si usa?***

neotylol Muco contiene il principio attivo acetilcisteina. Questo principio attivo fluidifica e scioglie le dense secrezioni che ristagnano nelle vie respiratorie e ne favorisce l'espettorazione.

Il muco che ricopre la mucosa delle vie respiratorie svolge un ruolo importante nella protezione dell'organismo da sostanze nocive presenti nell'aria come batteri, polvere e impurità chimiche. Queste sostanze irritanti vengono catturate dal muco che le rende inoffensive e poi eliminate con l'espettorato.

In caso di infezioni batteriche o virali (raffreddore, influenza, bronchite) e di irritazioni croniche indotte da sostanze nocive, si ha un aumento della produzione di muco. Se il muco diventa più denso e viscoso, può portare a un'ostruzione delle vie respiratorie con difficoltà di respirazione e di espettorazione.

Grazie all'effetto mucolitico, neotylol Muco fluidifica le secrezioni dense che possono quindi essere eliminate meglio con l'espettorato. In questo modo il rischio di un'eventuale infezione diminuisce. Liberando le vie respiratorie, la tosse si calma e la respirazione diventa più facile.

neotylol Muco è indicato per il trattamento della tosse da raffreddore con formazione eccessiva di muco.

### ***Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?***

Bere molto può incrementare l'effetto di neotylol Muco. Il fumo contribuisce all'eccessiva formazione di muco bronchiale. Rinunciando al fumo può rafforzare l'effetto di neotylol Muco.

### ***Quando non si può assumere neotylol Muco?***

neotylol Muco non deve essere preso in caso d'ipersensibilità conosciuta al principio attivo acetilcisteina o ad uno degli altri componenti o in caso di ulcera gastrica e intestinale

neotylol Muco non dovrebbe inoltre essere assunto assieme ad antitussivi in quanto questi sopprimono lo stimolo della tosse ed il naturale meccanismo di autopulizia delle vie respiratorie, impedendo quindi l'espettorazione del muco fluidificato. Ne può conseguire un ristagno di muco nei bronchi con il pericolo di causare crampi bronchiali e infezioni delle vie respiratorie. Il vostro medico saprà cosa fare in casi del genere.

neotylol Muco non è indicato per i bambini di età inferiore ai 12 anni.

### ***Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di neotylol Muco?***

L'utilizzo di neotylol Muco può, soprattutto all'inizio del trattamento, comportare una fluidificazione delle secrezioni bronchiali e favorire l'espettorazione. Se il paziente non è in grado di espettorarle in maniera sufficiente, il medico potrà prendere delle misure di sostegno.

Se in passato ha avuto eruzioni cutanee o disturbi respiratori a seguito dell'assunzione di un medicamento contenente lo stesso principio attivo di neotylol Muco, dovrebbe assolutamente informare il suo medico, farmacista o droghiere prima di iniziare la cura.

La somministrazione simultanea di altri medicinali può influenzare reciprocamente l'effetto. Infatti, l'efficacia di certi medicinali per il trattamento dell'insufficienza coronarica (ad es. la nitroglicerina nell'angina pectoris) può essere aumentata.



La somministrazione simultanea di acetilcisteina e di carbamazepina può portare alla riduzione della concentrazione di carbamazepina.

La somministrazione simultanea di antitussivi può pregiudicare l'effetto di neotylol Muco (vedi sopra: «Quando non si può assumere neotylol Muco?»). Inoltre, gli antibiotici non dovrebbero essere presi contemporaneamente a neotylol Muco ma soltanto dopo un intervallo di almeno 2 ore.

#### *Sostanze ausiliarie*

- neotylol Muco contiene 10 mg di aspartame per bustina. Aspartame è una fonte di fenilalanina. Può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria, una rara malattia genetica che causa l'accumulo di fenilalanina perché il corpo non riesce a smaltirla correttamente.
- neotylol Muco contiene 2072 mg di sorbitolo per bustina. Sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei (o il bambino) è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il suo medico prima che lei (o il bambino) prenda questo medicamento.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

#### ***Si può assumere neotylol Muco durante la gravidanza o l'allattamento?***

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono state compiute indagini scientifiche sistematiche. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Non ci sono informazioni sull'escrezione d'acetilcisteina nel latte materno. Pertanto, neotylol Muco dovrebbe essere usato durante l'allattamento soltanto se il medico curante lo ritiene necessario.

#### ***Come usare neotylol Muco?***

Salvo diversa prescrizione medica, il dosaggio abituale è:

- *Adolescenti da 12 anni e adulti:*

600 mg al giorno (1 bustina di polvere da 600 mg).

In caso di tosse persistente per più di 2 settimane dovrebbe consultare il suo medico o farmacista.

#### ***Applicazione***

Sciogliere il contenuto di una bustina in un bicchiere di acqua fredda o calda e bere immediatamente. Non sciogliere altri medicinali insieme a neotylol Muco in quanto sia il suo effetto che quella dell'altro medicamento potrebbe esserne influenzato o annullato.

All'apertura della bustina si può percepire un leggero odore di zolfo. Questo è tipico del principio attivo acetilcisteina e non ha alcuna influenza sulla sua efficacia.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli con il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

#### ***Quali effetti collaterali può avere neotylol Muco?***

Con l'assunzione di neotylol Muco possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: occasionalmente disturbi gastrointestinali come vomito, diarrea, nausea, dolori addominali o infiammazioni della mucosa orale come pure reazioni di ipersensibilità, orticaria, mal di testa e febbre. Inoltre, è possibile che si manifestino occasionalmente casi di polso accelerato, ipotensione e ronzio nelle orecchie, bruciori di



stomaco, emorragie e ritenzione idrica in viso.

Possono anche comparire reazioni allergiche di tipo comune (come ad es. eruzioni cutanee o pruriti). Qualora le reazioni di ipersensibilità dovessero provocare anche disturbi respiratori e spasmi bronchiali, cosa che può accadere in casi rari, dovrebbe interrompere immediatamente il trattamento con neotylol Muco e consultare un medico.

L'alito può temporaneamente avere un odore sgradevole.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

### ***Di che altro occorre tener conto?***

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

### ***Istruzioni di conservazione***

Non conservare a temperature superiori a 25 °C, nella confezione originale e fuori dalla portata dei bambini.

### ***Ulteriori indicazioni***

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

### ***Cosa contiene neotylol Muco?***

#### ***Principi attivi***

1 bustina di polvere per soluzione orale contiene 600 mg di acetilcisteina.

#### ***Sostanze ausiliarie***

Alpha-tocoferolo (E307), ossido di ferro rosso (E172ii), ossido di ferro giallo (E172iii), aspartame (E951), acesulfame potassico (E950), aroma di arancia (con maltodestrina, gomma arabica (E414), olio di arancia), sorbitolo (E420).

### ***Numero dell'omologazione***

68853 (Swissmedic).

### ***Dove è ottenibile neotylol Muco? Quali confezioni sono disponibili?***

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

neotylol Muco 600 mg: confezioni da 10 bustine.

### ***Titolare dell'omologazione***

NOBEL Pharma Schweiz AG, Risch.

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

