

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Mycoster® Crema

Pierre Fabre Pharma AG

Che cos'è Mycoster Crema e quando si usa?

Mycoster Crema è un antimicotico (un principio attivo che distrugge i funghi) destinato all'impiego locale. Il principio attivo è la ciclopiroxolamina.

Mycoster Crema è indicato per il trattamento di:

- micosi (malattie causate da funghi) della pelle con o senza sovrainfezione batterica,
- dermatite lieve o di media gravità, infiammatoria e seborroica del viso (arrossamento o desquamazione della pelle del viso).

Mycoster Crema può essere utilizzato solo su prescrizione medica.

Quando non si può usare Mycoster Crema?

Non impieghi Mycoster Crema in caso fosse allergico al principio attivo ciclopiroxolamina o ad una delle altre sostanze contenute in Mycoster Crema.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Mycoster Crema?

Se si verificano reazioni da ipersensibilità, il trattamento con Mycoster deve essere interrotto. Lo stesso vale anche in caso di formazione di vescicole in sede di applicazione.

Mycoster Crema non deve essere impiegato nella zona attorno agli occhi.

Mycoster Crema contiene alcool stearilico, alcool cetilico e alcool benzilico, che possono causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto e, nel caso dell'alcool benzilico, reazioni allergiche).

Non sono note interazioni con altri farmaci.

Nel caso in cui sia affetto/a da un'infezione da lieviti (candidosi), è sconsigliato usare un sapone dal pH acido.

Alla luce del limitato assorbimento nell'organismo, durante l'uso di Mycoster Crema non si prevedono effetti sulla capacità di guidare veicoli e sulla capacità di utilizzare macchine.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o,
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Mycoster Crema durante la gravidanza o l'allattamento?

Si consiglia di non impiegare il farmaco nelle donne in gravidanza o che allattano.

Prima di impiegare qualsiasi farmaco, consulti il suo medico o il suo farmacista.

Come usare Mycoster Crema?

Il farmaco è indicato soltanto per l'applicazione esterna sulla pelle. La zona da trattare deve essere pulita e asciutta. Prima e dopo ogni applicazione, si lavi accuratamente le mani.

Distribuisca Mycoster Crema sulle parti cutanee da trattare e massaggi lievemente la pelle con la crema finché essa non sia stata assorbita.



In caso di infezioni da funghi della pelle

La posologia raccomandata è di 2 applicazioni al giorno per una durata media di 21 giorni.

In caso di dermatite seborroica lieve o di gravità moderata del viso:

- all'inizio del trattamento si raccomanda una posologia di 2 applicazioni al giorno per la durata di 2 - 4 settimane.
- Successivamente, per la terapia di mantenimento, si raccomanda di applicare Mycoster Crema una volta al giorno per la durata di 28 giorni.

Se avesse dei dubbi su come proseguire il trattamento, consulti il suo medico o il suo farmacista.

Nel caso in cui avesse dimenticato di applicare Mycoster Crema

Non applichi una quantità doppia di crema e nemmeno la stessa quantità, due volte direttamente l'una dopo l'altra per compensare l'applicazione dimenticata. Prosegua il trattamento nel modo abituale.

L'impiego e la sicurezza di Mycoster nei bambini e negli adolescenti non sono stati ancora esaminati.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Mycoster Crema?

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Tra gli effetti collaterali frequenti che possono comparire già in occasione della prima applicazione, si registra un peggioramento transitorio nella sede dell'applicazione (sensazione di bruciore, arrossamento, prurito). Questi sintomi in genere sono di natura transitoria, pertanto, non interrompa il trattamento per questo motivo.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Tra gli effetti collaterali occasionali si registrano reazioni localizzate quali formazione di vescicole e reazioni allergiche generali. Se dovessero comparire questi effetti collaterali, dovrà interrompere immediatamente il trattamento e consultare un medico il più rapidamente possibile.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Reazioni locali quali per es. dermatite da contatto. Si metta in contatto con il suo medico.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Eczema

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese indicato.

Validità dopo apertura

3 mesi.

Istruzioni di conservazione

Conservare il tubetto ben chiuso e nella confezione originale a 15-30 °C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni



Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Mycooster Crema?

1 g di Mycooster Crema contiene:

Principi attivi

10 mg di ciclopiroxolamina

Sostanze ausiliarie

Ottildodecanolo, paraffina liquida, alcool stearilico, alcool cetilico, alcool benzilico, alcool miristilico, sorbitano stearato, polisorbato 60, acido lattico, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

59'959 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Mycooster Crema? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Tubetto da 30 g.

Titolare dell'omologazione

Pierre Fabre Pharma AG, Basel

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

