

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin ou du pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Albicansan® D5, gouttes

Médicament homéopathique

Quand Albicansan® D5, gouttes est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Albicansan® D5, gouttes peut être utilisé en cas d'eczémas et de mycoses.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Albicansan® D5, gouttes peut être pris simultanément.

Quand Albicansan® D5, gouttes ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Albicansan® D5, gouttes ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue au principe actif. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Albicansan® D5, gouttes peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien

Comment utiliser Albicansan® D5, gouttes?

Sauf prescription contraire du médecin prendre 8 gouttes une fois par jour, avant un repas. Lors d'un traitement simultané par injection, prendre 5-10 gouttes 2 fois par semaine les jours sans injections. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge/de l'enfant ne se produit pas, faites le examiner par un médecin. Adressez vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Albicansan® D5, gouttes peut-il provoquer?

La prise de Albicansan® D5, gouttes peut provoquer les effets secondaires suivants: dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité (allergie au principe actif) sont possibles. Si vous remarquez des effets



secondaire qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez-en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Albicansan® D5, gouttes et informez-en votre médecin ou votre pharmacien

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Albicansan® D5, gouttes?

1 mL de solution contient:

1 mL Candida albicans D5 aquos. dil. (HAB, 5a).

Numéro d'autorisation

51 255 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Albicansan® D5, gouttes? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 10 mL.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2006 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

