

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Albicansan® D5, gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Albicansan® D5, gocce?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Albicansan® D5, gocce può essere usato in caso di eczemi e micosi.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se contemporaneamente può assumere Albicansan® D5, gocce.

Quando non si può usare Albicansan® D5, gocce e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Albicansan® D5, gocce non può essere usato in caso d'ipersensibilità conosciuta all'ingrediente attivo. Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Albicansan® D5, gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Albicansan® D5, gocce?

Salvo diversa prescrizione medica: prendere 8 gocce una volta al giorno prima di un pasto. In caso di trattamento contemporaneo con Albicansan soluzione per iniezioni, prendere 5-10 gocce 2 volte la settimana nei giorni senza iniezioni. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo prescritta dal medico o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo/bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Albicansan® D5, gocce?

In seguito all'assunzione di Albicansan® D5, gocce possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: Raramente sono state osservate reazioni di ipersensibilità (allergia al ingrediente attivo). Se osserva effetti



collaterali non menzionati, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Albicansan® D5, gocce e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Albicansan® D5, gocce?

1 mL di soluzione contiene:

1 mL Candida albicans D5 aquos. dil. (HAB, 5a).

Numero dell'omologazione

51 255 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Albicansan® D5, gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia senza prescrizione medica.

Confezione da 10 mL.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

