

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Riamet® Dispersible/Riamet® Baby

Novartis Pharma Schweiz AG

Qu'est-ce que le Riamet Dispersible et Riamet Baby et quand est-il utilisé?

Riamet Dispersible et Riamet Baby sont utilisés pour traiter les accès aigus et non compliqués de paludisme dus au *Plasmodium falciparum* (un type particulier d'agent pathogène du paludisme). Riamet Dispersible et Riamet Baby contiennent 2 substances actives, l'artéméther et la luméfantrine. Ils agissent en tuant l'agent pathogène du paludisme.

Chez l'homme, l'infection palustre est due à la piqûre d'un moustique, l'anophèle, porteur d'un agent pathogène, le plasmodium. Les symptômes du paludisme peuvent apparaître au plus tôt 1 semaine après la piqûre de moustique (voir «Comment utiliser Riamet Dispersible et Riamet Baby?»).

Riamet Dispersible est utilisé pour traiter les jeunes enfants et les enfants qui pèsent au moins 5 kg et moins de 35 kg, jusqu'à l'âge de 12 ans. L'utilisation de Riamet Dispersible ne convient pas chez les nourrissons pesant moins de 5 kg.

Riamet Dispersible peut être prescrit en traitement d'urgence aux personnes voyageant dans des régions où sévit le paludisme, p.ex. lors de voyages dans des contrées isolées où il n'est éventuellement pas possible d'obtenir une aide médicale rapidement. Dans ces cas, le médecin traitant peut prescrire Riamet Dispersible afin que vous, en tant que parents ou responsables de l'enfant, puissiez le conserver et l'administrer à l'enfant qui voyage («traitement d'urgence»).

Veuillez noter qu'un tel traitement est une mesure de première urgence, justifiée uniquement si vous suspectez que votre enfant a contracté le paludisme, et qu'elle ne vous dispense pas de consulter un médecin dès que possible.

Riamet Baby est utilisé pour traiter les nourrissons et nouveau-nés qui pèsent au moins 2 kg et moins de 5 kg. Riamet Baby ne convient pas pour le traitement des nourrissons ou enfant ayant un poids corporel de 5 kg ou plus.

Riamet Dispersible et Riamet Baby ne sont pas utilisés ni pour prévenir le paludisme, ni pour traiter des formes sévères de paludisme (lorsque le cerveau, les poumons ou les reins sont atteints).

Riamet Dispersible et Riamet Baby ne doivent être pris que selon prescription du médecin.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Riamet Dispersible et Riamet Baby ne peuvent pas remplacer les mesures de protection qui suivent. Protégez votre enfant des piqûres de moustiques. Les anophèles sévissent surtout dès la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour.

Durant cette période, il est recommandé:

- d'utiliser des produits contre les moustiques,
- de porter des vêtements couvrant la peau le mieux possible,
- la nuit, d'utiliser une moustiquaire dans les chambres à coucher non protégées des moustiques.

Sachez encore que Riamet Dispersible et Riamet Baby ne sont pas utilisables sans discernement contre tous les agents pathogènes du paludisme, ni dans toutes les régions. Pour éviter les complications que peuvent entraîner le mauvais choix ou le dosage inadéquat d'un médicament antipaludéen, vous ne devez pas administrer Riamet Dispersible et Riamet Baby à votre enfant sans avoir consulté un médecin ou un



pharmacien (même lors de voyages ultérieurs dans une région où sévit le paludisme).

Quand Riamet Dispersible et Riamet Baby ne doivent-ils pas être pris?

Riamet Dispersible et Riamet Baby ne doivent pas être pris si:

- votre enfant est allergique à l'un des principes actifs ou l'un des excipients contenus dans le médicament. Si vous pensez que votre enfant peut être allergique, demandez conseil au médecin de votre enfant,
- votre enfant prend d'autres médicaments contre le paludisme contenant le principe actif halofantrine ou quinine,
- votre enfant souffre de troubles hépatiques ou rénaux sévères,
- votre enfant souffre d'un paludisme sévère avec atteinte cérébrale, pulmonaire ou rénale,
- votre enfant a une affection cardiaque, telle qu'une arythmie cardiaque, un rythme cardiaque lent ou une maladie cardiaque grave, ou présente par exemple à l'ECG un signal électrique anormal désigné comme «allongement de l'intervalle QT»,
- un membre de la famille de votre enfant (p.ex. parents, grands-parents, frères et sœurs) est décédé subitement d'un problème cardiaque ou a eu des problèmes de fréquence cardiaque à la naissance,
- votre enfant présente des taux sanguins d'électrolytes, comme le potassium ou le magnésium, abaissés,
- votre enfant a perdu beaucoup d'eau ou s'il a des problèmes d'ingestion de nourriture. Dans ces cas, il faut vous rendre à l'hôpital le plus proche;
- votre enfant prend certains médicaments:
 - médicaments pour le traitement de troubles du rythme cardiaque (antiarythmiques), tels que p.ex. la flécaïnide, le métoprolol,
 - médicaments pour le traitement de l'hypertension (bêta-bloquants),
 - médicaments pour le traitement de dépressions (neuroleptiques, antidépresseurs) tels que l'imipramine, l'amitriptyline, la clomipramine,
 - certains antibiotiques et médicaments contre les infections fongiques (p.ex. la rifampicine, un antibiotique destiné au traitement de la lèpre ou de la tuberculose, les macrolides, les fluoroquinolones, les imidazoles, les triazoles),
 - médicaments non sédatifs contre les allergies (p.ex. la terfénadine, l'astémizole),
 - médicaments contenant le principe actif cisapride (p.ex. Prepulsid®),
 - certains médicaments destinés au traitement de l'épilepsie (tels que la carbamazépine, la phénytoïne),
 - millepertuis (*Hypericum perforatum*), une plante destinée au traitement des dépressions.

Si l'un de ces critères s'applique à votre enfant, ne lui donnez pas Riamet Dispersible ou Riamet Baby et informez le médecin de votre enfant.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Riamet Dispersible et Riamet Baby?

Si l'état de votre enfant se détériore ou s'il est trop faible pour manger ou boire, veuillez prendre immédiatement contact avec le médecin de votre enfant. Celui-ci procédera sans doute avant et pendant le traitement à un test appelé électrocardiogramme (ECG) et contrôlera la concentration des électrolytes tels que le potassium et le magnésium dans le sang de votre enfant.

Si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments antipaludéens, informez-en son médecin, car certains de ces médicaments ne doivent pas être administrés en même temps que Riamet Dispersible ou Riamet Baby.



Les principes actifs de Riamet Dispersible/Riamet Baby peuvent influencer l'efficacité des méthodes contraceptives hormonales. Si votre fille utilise une méthode contraceptive hormonale, elle doit utiliser en plus une méthode de contraception non hormonale (voir également «Riamet Dispersible et Riamet Baby peuvent-ils être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?»).

Discutez avec le médecin de votre fille si votre fille se trouve dans les 3 premiers mois d'une grossesse, ou s'il est possible que votre fille soit enceinte. Le médecin prescrira éventuellement à votre fille un autre médicament contre le paludisme.

Si votre enfant prend des médicaments pour traiter une infection au VIH ou le SIDA, informez-en également le médecin de votre enfant.

Suite à la prise de Riamet Dispersible, des vertiges et/ou de la fatigue peuvent apparaître; l'aptitude à la conduite d'un véhicule ou à l'utilisation de machines peut être compromise.

Riamet Dispersible et Riamet Baby contiennent moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, ils sont donc pratiquement «sans sodium».

Riamet Dispersible et Riamet Baby contiennent du benzoate d'éthyle et peuvent renforcer la jaunisse (coloration jaune de la peau et des yeux) des nouveau-nés (jusqu'à 4 semaines).

Veuillez également informer le médecin de votre enfant ou votre pharmacien si votre enfant:

- souffre d'une autre maladie,
- est allergique,
- prend déjà d'autres médicaments ou utilise déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Riamet Dispersible et Riamet Baby peuvent-ils être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Riamet Dispersible doit être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement uniquement après consultation du médecin.

Riamet Dispersible ne doit pas être utilisé pendant les 3 premiers mois de la grossesse, si le médecin de votre fille est en mesure de lui administrer un autre traitement contre le paludisme, car ce médicament pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'enfant à naître. À un stade plus avancé de la grossesse, votre fille ne doit prendre Riamet Dispersible qu'en cas de nécessité absolue et pour autant que le médecin considère cette mesure comme adéquate.

Si votre fille utilise des méthodes contraceptives hormonales, d'autres méthodes de contraception non hormonales doivent être utilisées. Veuillez discuter des méthodes de contraception appropriées avec le médecin de votre fille.

Si votre fille est enceinte, en cas de suspicion d'une grossesse ou si elle débute une grossesse sous Riamet Dispersible, veuillez en informer le médecin de votre fille.

Riamet Dispersible ne doit pas être utilisé durant les 3 premiers mois d'une grossesse. C'est pourquoi il est conseillé aux femmes en âge de procréer qui ont reçu Riamet Dispersible comme médicament d'urgence d'utiliser une méthode de contraception efficace durant toute la durée de leur voyage, durant l'utilisation de Riamet Dispersible ainsi que jusqu'à la prochaine menstruation une fois le traitement arrêté.

Votre fille ne doit pas allaiter durant son traitement par Riamet Dispersible. À l'arrêt du traitement par Riamet Dispersible, elle pourra reprendre l'allaitement au plus tôt 4 semaines après la prise du dernier comprimé.

Riamet Baby n'est pas destiné à être utilisé chez les femmes en âge de procréer.

Comment utiliser Riamet Dispersible et Riamet Baby?

Le paludisme causé par *Plasmodium falciparum* est une maladie grave susceptible d'entraîner la mort et qui doit être complètement traitée. Aussi est-il très important que Riamet Dispersible et Riamet Baby soient pris exactement comme l'a prescrit le médecin, et que tous les comprimés dispersibles prescrits soient ingérés même si votre enfant se sent déjà mieux au bout d'un certain temps. Si votre enfant arrête trop tôt



de prendre les comprimés dispersibles, les symptômes pourraient resurgir.

Dans le cas où le médecin ou le pharmacien de votre enfant vous a donné du Riamet Dispersible avant un voyage dans une région où sévit le paludisme avec la recommandation de prendre Riamet Dispersible dès l'apparition des symptômes de paludisme (traitement d'urgence), veuillez observer les conseils suivants:

Le paludisme doit toujours être suspecté si votre enfant souffre d'une fièvre inexpliquée, avec ou sans autres symptômes tels que maux de tête et douleurs musculaires, faiblesse, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales et toux. Ces symptômes peuvent survenir dans un délai allant d'une semaine après le premier contact éventuel avec le paludisme (c.-à-d. après l'entrée dans une région où sévit le paludisme) à 2 mois après le dernier contact éventuel. Dans certains cas, cet intervalle peut même se prolonger au-delà de 2 mois. Dans tous les cas, votre enfant doit consulter sans tarder un médecin dès l'apparition des symptômes décrits ci-dessus.

En automédication, Riamet Dispersible ne doit être utilisé que lorsqu'il est impossible de contacter un médecin dans les 24 heures.

Le médicament ne doit être utilisé en automédication que si votre enfant se trouve depuis au moins 8 jours dans une région où sévit le paludisme.

Malgré l'automédication, vous devez contacter au plus vite un médecin qui pourra déterminer si votre enfant souffre du paludisme ou d'une autre maladie et qui pourra éventuellement mettre en place des mesures thérapeutiques complémentaires.

Administration de Riamet Dispersible et Riamet Baby à votre enfant

Veuillez suivre exactement les instructions du médecin de votre enfant.

Le médecin de votre enfant vous indiquera exactement combien de comprimés de Riamet Dispersible ou Riamet Baby vous devrez donner à votre enfant. Si vous n'êtes pas sûr de la quantité de Riamet Dispersible ou Riamet Baby à administrer et du moment où vous devez l'administrer, veuillez contacter le médecin de votre enfant ou un pharmacien.

Riamet Dispersible

Pour les nourrissons et enfants pesant de 5 kg à moins de 35 kg et âgés de 12 ans et moins

Mettez les comprimés de Riamet Dispersible dans un verre d'eau (env. 10 ml par comprimé). Attendez que le(s) comprimé(s) soit (soient) complètement dissous, puis mélangez délicatement le liquide avant de le donner à boire à votre enfant. Mettez ensuite à nouveau un peu d'eau (env. 10 ml) dans le verre et assurez-vous que votre enfant le boit entièrement.

Après la prise des comprimés de Riamet Dispersible, il est conseillé d'ingérer des aliments ou des boissons riches en graisse (p.ex. du lait), ceux-ci améliorent l'absorption et donc l'efficacité de Riamet Dispersible. Une teneur en graisses de 30 à 60 g par jour ou du lait maternel sont suffisants. Si votre enfant ne se sent pas assez bien pour boire ou manger, vous devez tout de même lui administrer Riamet Dispersible et prendre contact avec son médecin.

Quantité de Riamet Dispersible à administrer

Pour le traitement, 6 doses (1 à 3 comprimés par dose) en tout sont prises sur 3 jours selon le tableau ci-dessous. Ne pas dépasser la dose recommandée.

La première dose est prise au moment du diagnostic ou immédiatement après l'apparition de symptômes, la deuxième dose 8 heures plus tard. Pendant les deux jours suivants, une dose est prise deux fois par jour (le matin et le soir à intervalles de 12 heures). En tout, il y a 6 prises, réparties sur 3 jours selon le tableau suivant:

Posologie usuelle pour les nourrissons et enfants pesant d'au moins 5 kg à moins de 35 kg et âgés de 12 ans et moins



	Enfants de 25 – < 35 kg	Enfants de 15 – < 25 kg	Enfants de 5 – < 15 kg
<i>1^{re} prise: immédiatement</i>	3 comprimés	2 comprimés	1 comprimé
<i>2^e prise: 8 heures plus tard</i>	3 comprimés	2 comprimés	1 comprimé
<i>3^e prise:</i>	3 comprimés	2 comprimés	1 comprimé
<i>4^e prise:</i>	3 comprimés	2 comprimés	1 comprimé
<i>5^e prise:</i>	3 comprimés	2 comprimés	1 comprimé
<i>6^e prise:</i>	3 comprimés	2 comprimés	1 comprimé
<i>Total</i>	18 comprimés	12 comprimés	6 comprimés


Si votre enfant vomit dans l'heure qui suit la prise des comprimés de Riamet Dispersible, il faut lui administrer une nouvelle fois le nombre de comprimés prescrits et en informer immédiatement le médecin de votre enfant ou le pharmacien.

Respectez scrupuleusement la posologie prescrite par le médecin de votre enfant et n'utilisez que le nombre nécessaire de comprimés de Riamet Dispersible.

Rapportez les comprimés non utilisés à votre pharmacien qui les éliminera selon les règles.

Riamet Baby

Pour les nouveau-nés et les nourrissons ayant un poids corporel d'au moins 2 kg et de moins de 5 kg



Ajoutez
2 comprimés
dispersibles de
Riamet Baby à
une petite quantité
d'eau (environ une
cuillère à café
[3 ml]) dans un
petit gobelet

Mélangez
délicatement
jusqu'à ce que les
comprimés soient
complètement
dissous.







Administrez immédiatement le liquide à votre enfant depuis le même gobelet. Ajoutez ensuite encore environ une cuillère à café (3 ml) d'eau dans le gobelet, remuez et administrez le liquide à votre enfant. Veillez à ce que votre enfant boive tout.

Nourrissez ensuite votre enfant avec du lait maternel ou du lait infantile, car des aliments gras améliorent l'absorption et, ainsi, l'efficacité de Riamet Baby. Si votre enfant se sent trop malade pour manger ou boire, vous devez malgré tout administrer Riamet Baby et contacter le médecin de votre enfant.

Ou


Suivez les étapes ci-dessous si vous utilisez une seringue orale (de préférence, une seringue de 5 ml):



Prenez une seringue orale propre et retirez-en le piston. Introduisez deux comprimés dispersibles de Riamet Baby dans la seringue. Remplacez le piston.

Remplissez un verre ou une tasse





d'eau et aspirez l'eau dans la seringue en tirant lentement sur le piston jusqu'au repère de 3 ml, afin de couvrir les comprimés.

Retournez délicatement la seringue à plusieurs reprises jusqu'à dissolution complète des comprimés. **NE PAS AGITER.**



Immédiatement après la préparation, administrez la totalité du contenu de la seringue orale, lentement et délicatement sur la face intérieure de la joue de l'enfant.

Ensuite, aspirez à nouveau de l'eau (3 ml) dans une seringue orale et administrez-la à votre enfant. Veillez à ce que celui-ci boive tout.

Nourrissez ensuite votre enfant avec du lait maternel ou du lait infantile, car des aliments gras améliorent l'absorption et, ainsi, l'efficacité de Riamet Baby. Si votre enfant se sent trop malade pour manger ou



	boire, vous devez malgré tout administrer Riamet Baby et contacter le médecin de votre enfant.
--	--

Quantité de Riamet Baby à administrer:

Six doses de deux comprimés dispersibles, réparties sur 3 jours, sont administrées de la manière suivante:

La première dose de 2 comprimés dispersibles est administrée au moment du diagnostic, la deuxième dose de 2 comprimés dispersibles est donnée 8 heures plus tard. Au cours des deux jours suivants, 2 comprimés dispersibles chaque fois sont donnés deux fois par jour (à intervalles de 12 heures, par exemple le matin et le soir).

Pour un traitement complet du paludisme de votre enfant, il est très important que les 12 comprimés dispersibles soient pris sur les 3 jours, aux intervalles indiqués.

Si votre enfant vomit dans l'heure qui suit la prise des comprimés, il faut lui administrer une nouvelle fois une dose de 2 comprimés dispersibles et en informer immédiatement le médecin de votre enfant ou le pharmacien.

Que faire si vous avez oublié une dose?

Si vous avez oublié d'administrer une dose de Riamet Dispersible ou Riamet Baby à votre enfant, donnez-la-lui dès que vous vous en rendez compte. Donnez ensuite à votre enfant la dose suivante à l'heure habituelle. Ne donnez pas à votre enfant la dose double lorsque la prise précédente a été oubliée.

Que faire en cas de surdosage?

Si vous avez accidentellement administré à votre enfant plus de comprimés de Riamet Dispersible ou Riamet Baby que prescrits par le médecin, vous devez vous rendre immédiatement avec votre enfant chez un médecin ou au service des urgences de l'hôpital le plus proche, ou vous assurer que quelqu'un consulte un médecin urgentiste pour votre enfant. Emportez avec vous le médicament ou l'emballage vide.

Que faire si les symptômes réapparaissent après le traitement?

Si les symptômes du paludisme réapparaissent après le traitement par Riamet Dispersible ou Riamet Baby, un médecin doit dans tous les cas être consulté immédiatement. Le médecin de votre enfant décidera du traitement à entreprendre.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous au médecin de votre enfant ou au pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Riamet Dispersible et Riamet Baby peuvent-ils provoquer?

Comme tous les médicaments, Riamet Dispersible ou Riamet Baby peuvent provoquer des effets secondaires, ceux-ci ne se manifestant toutefois pas chez tout le monde.

Très fréquent (concerne plus d'un utilisateur sur 10)

Perte d'appétit, toux, vomissements.

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Maux de tête, vertiges, maux de ventre, diarrhée, nausées, éruption cutanée, douleurs articulaires et musculaires, tensions musculaires involontaires, fatigue et abattement général, symptômes tels que nausées persistantes inexpliquées, problèmes gastriques, perte d'appétit ou fatigue ou faiblesse inhabituelle (signes de problèmes du foie), allongement du QT à l'électrocardiogramme.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)



Troubles du sommeil, somnolence, palpitations, prurit (démangeaisons).

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Réaction allergique (p.ex. éruption, démangeaisons, gonflement surtout du visage ou de la gorge, troubles respiratoires ou de la déglutition, sensation de vertige) et troubles du rythme cardiaque (appelés allongement du QT).

Certains effets secondaires peuvent être graves. Consultez le médecin de votre enfant sans délai en cas de survenue des effets secondaires suivants: réaction allergique (éruption cutanée et/ou rougeur du visage, gonflement surtout au visage ou dans la région du cou, difficulté à respirer ou à avaler).

Si votre enfant vomit dans l'heure qui suit la prise des comprimés, il faut lui administrer une nouvelle fois la dose de comprimés prescrite et en informer immédiatement le médecin de votre enfant ou le pharmacien.

Les autres effets secondaires mentionnés ne nécessitent généralement pas de traitement; consultez cependant le médecin de votre enfant si l'un ou l'autre de ces symptômes persiste ou devient gênant.

Les effets secondaires suivants ont été rapportés occasionnellement chez l'adulte mais non chez l'enfant ou le jeune enfant: troubles de la motricité, démarche anormale, diminution de la sensibilité ou picotements.

Si vous remarquez des effets secondaires chez votre enfant, veuillez en informer le médecin de votre enfant ou le pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Riamet Dispersible et Riamet Baby.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.

Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contiennent Riamet Dispersible et Riamet Baby?

Riamet Dispersible

1 comprimé dispersible contient:

Principes actifs

Artéméthér 20 mg, luméfantrine 120 mg.

Excipients

Cellulose microcristalline, hypromellose, silice colloïdale anhydre, polysorbate 80, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, crospovidone, saccharine sodique, arôme de cerise (contient du benzoate d'éthyle), maltodextrine.

Riamet Baby

1 comprimé dispersible contient:

Principes actifs

Artéméthér 2.5 mg, luméfantrine 30 mg.



Excipients

Cellulose microcristalline, hypromellose, silice colloïdale anhydre, polysorbate 80, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, crospovidone, saccharine sodique, arôme de cerise (contient du benzoate d'éthyle).

Numéro d'autorisation

58528, 67664 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Riamet Dispersible et Riamet Baby? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale non renouvelable.

Que contient un emballage de Riamet Dispersible

Emballage à 12 comprimés.

Les parents ou l'aide-soignant doivent être correctement informés de la posologie à administrer en fonction du poids corporel de l'enfant. Selon la dose nécessaire, il est possible que tous les comprimés de l'emballage ne soient pas utilisés. Veuillez rapporter à votre pharmacien les comprimés en trop, afin qu'ils soient éliminés d'une façon appropriée.

Que contient un emballage de Riamet Baby

Chaque emballage contient une plaquette thermoformée avec 12 comprimés dispersibles.

Titulaire de l'autorisation

Novartis Pharma Schweiz AG, Risch; Domicile: 6343 Rotkreuz

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

