

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou votre dentiste, ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre dentiste, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Parodontosan® Gel

Tentan AG

Qu'est-ce que Parodontosan Gel et quand doit-il être utilisé?

Parodontosan Gel est un antiseptique pour le traitement des affections de la cavité buccale et pour l'hygiène buccodentaire. Il contient de la chlorhexidine, dotée d'une large efficacité antimicrobienne contre les bactéries et les mycoses, ainsi que des composants végétaux dont l'action légèrement astringente favorise la désenflure des gencives enflammées et protège les collets dentaires dénudés. Parodontosan Gel est utilisé pour prévenir et traiter des inflammations bucco-pharyngiennes provoquées par des bactéries ou des mycoses, pour prévenir des infections précédant ou suivant des interventions odontologiques, ainsi que pour favoriser l'hygiène buccodentaire.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

L'action de la chlorhexidine est annulée par des solutions alcalines, des savons et des agents nettoyants chargés négativement. Parodontosan Gel ne devrait donc pas entrer en contact avec de l'eau fortement alcaline durant son utilisation. Parodontosan Gel contient de l'alcool.

Quand Parodontosan Gel ne doit-il pas être utilisé?

Parodontosan Gel ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue à la chlorhexidine ou à l'un des excipients.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Parodontosan Gel?

Parodontosan Gel doit être utilisé avec prudence en cas d'inflammation du ligament alvéolo-dentaire.

En cas d'irritation de la muqueuse buccale, continuez le traitement en réduisant la quantité de gel ou en le diluant.

L'hydroxystéarate de macroglycérol peut provoquer des irritations cutanées.

Ce médicament contient 73 mg d'alcool (éthanol) par application d'une quantité de la taille d'une phalange correspondant à 150 mg/g (18% v/v). Cela peut provoquer une sensation de brûlure sur une peau endommagée.

Veuillez informer votre médecin, votre dentiste, votre pharmacien ou votre droguiste si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicament en usage externe (même en automédication!)

Parodontosan Gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée.

Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre ou utiliser des médicaments durant la grossesse ou l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre dentiste, de votre pharmacien



ou de votre droguiste.

Comment utiliser Parodontosan Gel?

Adultes et adolescents de plus de 12 ans:

1. En cas d'inflammations:

Prélevez une petite quantité de gel de la taille d'une phalange et appliquez-le sur la zone concernée avec un doigt, deux fois par jour, après chaque repas et en particulier avant le coucher.

2. Après le brossage des dents:

Mettez une petite quantité de gel de la taille d'une phalange sur une brosse à dents souple, puis massez soigneusement les gencives avec cette brosse. Crachez bien le gel après le traitement et n'ingérez aucune nourriture ou boisson pendant une demi-heure au moins pour laisser agir le médicament.

3. Prothèse dentaire:

Les prothèses dentaires fixes ou les appareils orthodontiques fixes peuvent être nettoyés avec votre dentifrice habituel. Utilisez ensuite un doigt pour masser une petite quantité de gel de la taille d'une phalange sous les éléments d'un pont dentaire, dans les espaces interdentaires ou au niveau des racines dentaires. Grâce à l'application du gel, même les bandes et les ressorts orthodontiques ainsi que les pansements parodontaux sont aseptisés.

L'utilisation et la sécurité de Parodontosan Gel n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants de moins de 12 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin ou votre dentiste. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez consulter votre médecin, votre dentiste, votre pharmacien ou votre droguiste.

Quels effets secondaires Parodontosan Gel peut-il provoquer?

Parodontosan Gel peut entraîner un léger effet de brûlure au moment de l'application ou du brossage. Le fait d'avaler accidentellement une quantité importante de Parodontosan Gel peut entraîner des nausées.

L'utilisation de Parodontosan Gel peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquents (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

En cas d'utilisation prolongée, il peut se produire une coloration des dents (dans 50% des cas selon les données officielles), qui est généralement réversible dès l'arrêt du traitement.

Occasionnellement (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Altération du sens du goût (dysgueusie)

Rares (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10'000)

Réactions allergiques

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre dentiste, votre pharmacien ou votre droguiste.

Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarque concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C) et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires



Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre dentiste, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Parodontosan Gel?

1 g de gel buccal contient:

Principes actifs

2 mg de gluconate de chlorhexidine, 3,8 mg de teinture de myrrhe (1:5), agent d'extraction éthanol 90% v/v, 1 mg d'huile essentielle de sauge

Excipients

Éthanol 18 vol. %, xylitol (E 967), glycérol (E 422), 25 mg d'hydroxystéarate de macroglycérol, hydroxyéthylcellulose, huile essentielle de menthe, eau épurée

Numéro d'autorisation

56070 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Parodontosan Gel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tube en alu contenant 35 g de gel buccal.

Titulaire de l'autorisation

Tentan AG, 4452 Itingen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

PI_Parodontosan_Gel/12.20

