

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Proglycem® Capsules

MSD Merck Sharp & Dohme AG

Qu'est-ce que Proglycem et quand doit-il être utilisé?

Proglycem contient comme principe actif le diazoxide, qui augmente le taux de sucre dans le sang et abaisse la tension artérielle. Le diazoxide diminue aussi l'élimination d'eau et de sels par les reins. Proglycem est utilisé pour combattre les états liés à un taux trop bas de sucre dans le sang (hypoglycémie) due à des tumeurs situées ou non dans le pancréas ou à une sensibilité à la leucine, ainsi que pour réduire la tension artérielle chez les patients souffrant d'une hypertension artérielle sévère liée à un trouble de la fonction rénale, ne répondant pas aux traitements habituels.

Proglycem doit être pris uniquement sur prescription du médecin.

Quand Proglycem ne doit-il pas être pris?

Proglycem ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité au diazoxide (le principe actif de Proglycem), à d'autres substances de la même classe (thiazides, médicaments diurétiques) ou à l'un des excipients, en cas de diabète ou de phéochromocytome (tumeur de la médullosurrénale).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Proglycem?

Votre médecin contrôlera régulièrement votre taux de sucre dans le sang (glycémie) et dans les urines (glycosurie) afin de pouvoir corriger une trop forte élévation du sucre dans le sang provoquée par Proglycem.

Parce que Proglycem réduit l'élimination urinaire de l'acide urique, votre médecin contrôlera régulièrement votre taux d'acide urique dans le sang, surtout si vous souffrez de la goutte.

Proglycem provoque une rétention d'eau qui peut entraîner une défaillance cardiaque aiguë chez les personnes présentant une insuffisance cardiaque. La prise de médicaments qui accroissent l'excrétion urinaire (diurétiques) permet de remédier à cet état.

Interactions avec d'autres médicaments La prise simultanée de médicaments diurétiques peut renforcer l'augmentation des taux sanguins de sucre et d'acide urique et la baisse de la tension artérielle provoquées par Proglycem. En outre, l'augmentation du taux de sucre dans le sang induite par Proglycem peut être accentuée par la prise simultanée de phénytoïne (médicament contre l'épilepsie), de corticostéroïdes (médicaments anti-inflammatoires tels que la cortisone) et de contraceptifs oraux (la «pilule»), et être diminuée par des alpha-bloquants (médicaments destinés au traitement de l'hypertension artérielle et de l'hypertrophie bénigne de la prostate). Proglycem peut renforcer l'action des médicaments antihypertenseurs et éventuellement celle des médicaments anticoagulants et diminuer l'action antiépileptique de la phénytoïne. Votre médecin décidera des médicaments que vous pouvez prendre en même temps que Proglycem ou de l'opportunité d'ajuster la dose de Proglycem.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines, car il peut provoquer des nausées et des vertiges.

N'utilisez Proglycem que pour l'affection dont vous souffrez actuellement et pour laquelle le médecin vous l'a prescrit. Ne l'utilisez pas pour des affections ultérieures.

Proglycem contient du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre Proglycem.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si



- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Proglicem peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes une femme enceinte ou envisageant une grossesse, vous ne devez pas prendre Proglycem, sauf si votre médecin le juge absolument nécessaire.

Si vous êtes traitée par Proglycem pendant l'allaitement, vous devez cesser d'allaiter.

Comment utiliser Proglycem?

Prendre les capsules avec un peu de liquide, sans les croquer. Votre médecin déterminera la dose en fonction de la sévérité de votre maladie.

Pour le traitement de l'hypoglycémie, la dose initiale chez les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 2 ans est de 3 mg par kg et par jour, à prendre en trois doses égales, à raison d'une dose toutes les 8 heures environ. Suivant la façon dont vous répondrez au médicament, votre médecin pourra diminuer ou augmenter cette dose sans toutefois dépasser 8 mg par kilo et par jour.

En cas d'hypertension artérielle sévère, la dose initiale est de 100 mg 2 à 3 fois par jour. La dose sera adaptée individuellement en fonction de la réponse au traitement et de la tolérance. La dose doit être réduite chez les personnes dont les reins ont une fonction restreinte.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Proglycem peut-il provoquer?

La prise de Proglycem peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Rétention de liquide (avec gonflement des membres et prise de poids), développement excessif du système pileux, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, perte d'appétit, perte du sens du goût, signes d'un taux de sucre anormalement élevé (forte sensation de soif, nausées, vomissements, faiblesse musculaire, crampes abdominales, respiration anormalement profonde), accélération du pouls, chute de la tension artérielle, éruption cutanée, sensibilité à la lumière, maux de tête, faiblesse et vertiges, diminution des globules blancs et des plaquettes, augmentation de l'acide urique dans le sang, troubles visuels.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Occlusion intestinale, pancréatite.

Lors d'un traitement de longue durée, des troubles de l'équilibre et de la coordination des mouvements du corps peuvent apparaître.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Accumulation de liquide dans le péricarde (épanchement péricardique).

Réaction cutanée sévère, connue sous le nom de syndrome DRESS. Les symptômes du DRESS comprennent une éruption cutanée, de la fièvre, un gonflement des ganglions lymphatiques et une élévation des éosinophiles (une forme de globules blancs).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage



Conserver à température ambiante (15-25°C). Conserver le récipient dans son carton pour le protéger de la lumière.

Conserver hors de la portée des enfants!

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Proglicem?

Principes actifs

1 gélule contient 25 mg de diazoxide comme principe actif.

Excipients

Contenu de la capsule

Monohydrate de lactose, stéarate de magnésium

Enveloppe de la capsule

Gélatine

Numéro d'autorisation

39081 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Proglicem? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 100 capsules.

Titulaire de l'autorisation

MSD MERCK SHARP & DOHME AG

Lucerne

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

MK6783-C-CCDS102024/RCN000027440-CH

