

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Aknichthol®

Merz Pharma (Schweiz) AG

Che cos'è Aknichthol e quando si usa?

Aknichthol contiene due principi attivi:

- sodio bituminosolfonato chiaro (olio di scisto solfonato chiaro): svolge un'azione antibatterica, attenua le infiammazioni cutanee doloranti e stimola l'irrorazione sanguigna
- acido salicilico: normalizza il processo di cheratinizzazione delle ghiandole sebacee che in caso d'acne è troppo marcato e ha anche un'azione antinfiammatoria

Aknichthol è un medicamento per il trattamento topico dell'acne da lieve a moderatamente grave.

L'uso di Aknichthol soddisfa tre principi della terapia locale dell'acne comune (foruncoli/punti neri):

1. pulizia e sgrassamento
2. azione terapeutica sinergica dei diversi principi attivi
3. effetto coprente (copertura cosmetica dei cambiamenti visibili della pelle)

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Nei casi ostinati di acne il successo della cura è coadiuvato da trattamenti orali. È opportuno variare anche lo stile di vita generale. A questo scopo bisogna consultare il medico. È necessario continuare il trattamento con Aknichthol ancora per qualche tempo dopo la scomparsa dei cambiamenti visibili della pelle per evitare ricadute.

Quando non si può usare Aknichthol?

Non usare il medicamento in caso di ipersensibilità ai costituenti citati.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Aknichthol?

L'uso addizionale di altri preparati ad azione locale può compromettere gli effetti di Aknichthol e deve essere evitato.

L'uso concomitante di diversi medicinali per il trattamento locale dell'acne può provocare secchezza e irritazione della pelle e dovrebbe avvenire solo dietro prescrizione medica.

Altri medicinali per uso topico possono penetrare più a fondo nella pelle.

Inoltre sono possibili interazioni con il metotrexato e le sulfoniluree.

Aknichthol deve essere usato solo sulle zone colpite da acne, evitando il contatto con gli occhi e le mucose. Non applicare sulla pelle lesionata né su superfici cutanee estese.

Per via del contenuto di acido salicilico, chi soffre di disfunzioni renali può usare Aknichthol solo dopo consulto medico. In questo caso, Aknichthol può essere applicato solo su una zona cutanea di massimo 10 cm² e per non più di 3 giorni.

Non usare nei bambini di età inferiore a 12 anni.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,



- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente!

Si può usare Aknichthol durante la gravidanza o l'allattamento?

Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad usare medicinali durante la gravidanza e l'allattamento. Se è in gravidanza, se desidera esserlo o se allatta, consulti il medico prima di usare Aknichthol.

Come usare Aknichthol?

Adulti e adolescenti sopra i 12 anni:

Salvo diversa prescrizione del medico, Aknichthol va applicato alla mattina e alla sera. Le zone affette devono essere lavate con acqua calda o fredda, utilizzando un detergente delicato per la pelle, e poi asciugate. Dopo aver agitato bene la sospensione, versare uniformemente circa 20 gocce su una compressa (o su un batuffolo o dischetto di cotone) strofinandola leggermente sulle zone interessate fino a coprirle con uno strato impercettibile di sospensione. Evitare il contatto con palpebre e labbra. Gli uomini devono applicare la sospensione sulle zone in cui cresce la barba nel senso dei peli.

La durata del trattamento dipende dalle prescrizioni del medico.

L'uso e la sicurezza di Aknichthol non sono stati ancora studiati nei bambini sotto i 12 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Aknichthol?

L'uso di Aknichthol può provocare i seguenti effetti collaterali:

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

In rari casi possono verificarsi reazioni di ipersensibilità della pelle che si manifestano sotto forma di forte prurito, sensazione di bruciore e forte arrossamento della pelle. In tal caso si rivolga al suo medico.

Una lieve secchezza cutanea e una modesta desquamazione della pelle in seguito all'uso di Aknichthol sono effetti voluti. Le rughe provocate dalla secchezza scompaiono dopo la desquamazione.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione:

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C). Tenere fuori della portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni:

Trattare le macchie di Aknichthol con sapone di bile solido, lasciar agire per circa 5 minuti, quindi lavare con detersivo in polvere alla massima temperatura consentita.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Aknichthol?

1 g di Aknichthol contiene:

Principi attivi

10 mg di sodio bituminosolfonato chiaro, 5 mg di acido salicilico.

Sostanze ausiliarie



Acqua depurata, alcool isopropilico, macrogol-4-lauriletere, amido di mais, biossido di titanio (E171), biossido di silicio altamente disperso, trigliceridi a catena media, ossidi di ferro e ossido di idrossido ferrico (III) (E172).

Numero dell'omologazione

33005 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Aknichthol? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flaconi da 30 g di sospensione per applicazione cutanea.

Titolare dell'omologazione

Merz Pharma (Svizzera) SA, 4123 Allschwil

Fabbricante

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermann & Co. (GmbH & Co.) KG, Hamburg, Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

