

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Fastum[®] gel

A. Menarini GmbH

Qu'est-ce que Fastum gel et quand doit-il être utilisé?

Le gel Fastum est un anti-inflammatoire non stéroïdien possédant des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Le gel pénètre dans la peau et exerce un effet rafraîchissant.

Le gel Fastum est utilisé en traitement local des affections douloureuses inflammatoires ou consécutives à un traumatisme des articulations, des tendons, des ligaments et des muscles.

Selon prescription du médecin.

Quand Fastum gel ne doit-il pas être pris/utilisé?

Fastum gel ne doit pas être utilisé si vous êtes allergique au kétoprofène, à l'acide tiaprofénique ou à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, à l'acide acétylsalicylique, au fénofibrate (pour abaisser les lipides sanguins), aux produits solaires, aux parfums ou à l'un des excipients.

Arrêtez immédiatement le traitement avec Fastum si une réaction cutanée survient, y compris une réaction liée à l'utilisation simultanée de produits contenant de l'octocrylène. L'octocrylène est un adjuvant entrant dans la composition de nombreux produits cosmétiques et d'hygiène, tels que shampoings, after-shave, gels pour la douche et le bain, crèmes pour la peau, rouge à lèvres, crèmes anti-âge, démaquillants et sprays pour cheveux.

Les zones cutanées traitées ne doivent être exposées ni au soleil ni aux rayons UV en solarium pendant le traitement avec Fastum et dans les deux semaines qui suivent.

La préparation ne doit pas être appliquée sur des lésions cutanées, telles que des plaies ouvertes, des inflammations ou des infections de la peau, ainsi qu'en cas d'exzéma ou d'acné.

Vous ne devez pas utiliser Fastum Gel si vous vous trouvez dans les 3 derniers mois de votre grossesse.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Fastum gel?

En particulier au cours d'un traitement à long terme, une sensibilisation ou une irritation locales peuvent survenir.

Les yeux et les muqueuses ne doivent pas entrer en contact avec la préparation. L'exposition au soleil (même voilé) ou aux rayonnements UVA (en solarium) des zones cutanées qui ont été en contact avec Fastum gel peut éventuellement provoquer des réactions cutanées sévères (photosensibilisation). Pour cette raison, il est important:

- de protéger les zones traitées contre l'exposition au soleil par le port d'un vêtement, pendant toute la durée du traitement et les deux semaines suivant son arrêt, pour éviter tout risque de photosensibilisation.
- de procéder à un lavage soigneux des mains après chaque utilisation du produit.

Le traitement doit être immédiatement interrompu si des réactions cutanées apparaissent après l'utilisation de Fastum gel.

Ce médicament contient 307 mg d'alcool (éthanol) par gramme de gel. L'éthanol peut provoquer une sensation de brûlure sur une peau endommagée.

Fastum Gel contient des parfums (néroli et lavandin) dont les composants (citral, citronellol, coumarine, farnésol, géraniol, d-limonène et linalool) peuvent provoquer des réactions allergiques.



Une surveillance doit être effectuée en cas d'utilisation concomitante de préparations à base de coumarine/warfarine ayant un effet sur la coagulation sanguine.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien

- si vous souffrez d'une autre maladie,
- si vous êtes allergique ou
- si vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Fastum gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ou si vous pensez être enceinte ou envisager une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

N'utilisez pas Fastum Gel si vous vous trouvez dans les 3 derniers mois de votre grossesse. Sauf nécessité absolue et recommandation de votre médecin, vous devez éviter d'utiliser Fastum Gel pendant les 6 premiers mois de la grossesse. Si vous l'utilisez pendant cette période, la dose doit être aussi faible que possible et la durée du traitement aussi courte que possible.

Les formes d'administration orale (comprimés par ex.) de médicaments contenant du kétoprofène peuvent provoquer des effets secondaires chez votre enfant à naître. On ne sait pas si un risque identique existe également lors de l'application de Fastum Gel sur la peau.

Comment utiliser Fastum gel?

Adultes:

Appliquez une à deux fois par jour sur la zone cutanée concernée 3 à 5 cm de gel ou plus (en fonction de l'étendue de l'affection) et massez légèrement pour améliorer l'absorption du produit.

Enfants et adolescents:

Fastum gel ne doit pas être appliqué chez l'enfant et l'adolescent car l'expérience est insuffisante dans cette tranche d'âge.

Ne changez pas le dosage prescrit de votre propre chef. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien lorsque vous pensez que l'efficacité de votre médicament est trop faible ou trop forte.

Quels effets secondaires Fastum gel peut-il provoquer?

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100)

Des réactions cutanées telles que: rougeurs, brûlure, prurit, irritation cutanée, eczéma de contact, formation de vésicules, exanthème, réactions cutanées allergiques.

Rare (concerne 1 à 10 personnes sur 10 000)

Cas des réactions cutanées graves, avec formation de bulles ou de pustules, qui peuvent s'étendre ou se généraliser.

Très rare (concerne moins d'une personnes sur 10 000)

Des troubles de la fonction rénale

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité


Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention «EXP».

Remarques concernant le stockage



Conserver à température ambiante (15-25°C) et hors de portée des enfants.

Remarques concernant la manipulation

	Fastum gel dispenseur: Avant la 1^{ère} utilisation, une purge répétée de la pompe peut être nécessaire. Alternativement, il est possible d'exercer, au moyen du capuchon, une pression sur le fond du dispenseur, jusqu'à ce que le gel soit libéré (voir l'illustration).
--	--

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui dispose d'une information détaillée destinée aux représentants des professions médicales.

Que contient Fastum gel?

Gel à appliquer sur la peau

Principes actifs

Ketoprofenum (25 mg/1 g gel)

Excipients

Aromatica neroli aetheroleum (cum citralum, citronellum, farnesolum, limonenum et linaloolum), aromatica lavandulae aetheroleum (cum cumarinum, farnesolum, geraniolum, d-limonenum et linaloolum), ethanolum, triethanolaminum, carbomerum, aqua purificata q.s. ad gelatum pro 1 g.

Numéro d'autorisation

50227 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Fastum gel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Les présentations suivantes sont disponibles:

Tubes de 50 g et 100 g, dispenseur de 100 g

Titulaire de l'autorisation

A. Menarini GmbH, Zurich

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

