

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Fucidin® H

LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.

Qu'est-ce que Fucidin H et quand doit-il être utilisé?

Fucidin H contient d'une part de l'acide fusidique, qui est un antibactérien et, d'autre part, de l'acétate d'hydrocortisone, qui a une action antiallergique et anti-inflammatoire.

Fucidin H est utilisée sur prescription du médecin en cas d'affections allergiques ou inflammatoires de la peau accompagnées d'une infection bactérienne. Elle est conçue pour l'application locale. Elle inhibe le développement des agents pathogènes bactériens et supprime rougeurs, enflures ou démangeaisons.

Quand Fucidin H ne doit-il pas être utilisé?

Si vous savez être hypersensible aux corticostéroïdes, à l'acide fusidique ou à des adjuvants contenus dans Fucidin H, n'utilisez pas Fucidin H. Fucidin H ne doit pas non plus être utilisée en cas d'infections cutanées associées à la tuberculose, de virus (bouton de fièvre, varicelle, réactions à des vaccins, par exemple) et des champignons, de dermatite périorale ou de rosacée.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Fucidin H?

Fucidin H est un médicament très puissant. Ne dépassez pas la durée du traitement prescrite par votre médecin, qui est normalement de 2 semaines.

Si les symptômes persistent au-delà d'une semaine de traitement ou si l'affection cutanée s'aggrave, consultez votre médecin. Une allergie ou une infection provoquée par des germes insensibles peut en être la cause. Informez également votre médecin en cas de démangeaisons et de rougeurs, des vésicules ou un amincissement important de la peau et des blessures.

Si vos symptômes réapparaissent dans les 2 semaines suivant l'arrêt du traitement, ne réutilisez pas la crème sans avoir consulté au préalable votre médecin, sauf si votre médecin vous a fourni des instructions dans ce sens. Si vos symptômes réapparaissent après leur disparition, vous devez consulter un médecin avant d'une répétition du traitement si la rougeur s'étend au-delà de la zone initialement traitée et si la peau brûle.

En cas de traitement prolongé de larges zones de la peau ou de pansements occlusifs chez les enfants et les petits enfants, un contrôle médical régulier est nécessaire.

Chez les nourrissons et les petits enfants, il faut éviter un traitement prolongé continu ou sur de larges surfaces.

La prudence est nécessaire en cas d'utilisation sur de grandes surfaces ainsi que sur des zones cutanées à résorption accrue (plaies ouvertes, peau endommagée, zones intertrigineuses (plis cutanés) dans les articulations ainsi qu'entre les doigts ou les orteils, à proximité des muqueuses et autour de l'œil).

Fucidin H doit être utilisé avec précaution près des yeux et, si possible, ne doit pas entrer en contact avec l'œil.

N'utilisez Fucidin H que pour votre affection cutanée actuelle, pour laquelle le médecin vous l'a prescrit. Ne l'utilisez pas pour d'autres affections cutanées ultérieures. Ne le remettez pas à d'autres personnes.

Si des réactions d'hypersensibilité inattendues se produisaient, il faut interrompre le traitement.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie



- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).

Fucidin H peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Bien que jusqu'à présent aucun effet dommageable n'ait été observé sur le fœtus lorsque Fucidin H a été utilisée pendant la grossesse, les études sur les animaux indiquent un risque de malformations à très fortes doses. C'est pourquoi dans la mesure du possible, Fucidin H ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Si Fucidin H doit être appliqué sur les seins, l'allaitement est interdit.

En tout cas, demandez conseil à votre médecin et informez-le de votre grossesse, qu'elle survienne avant ou pendant le traitement.

Comment utiliser Fucidin H?

Sauf prescription contraire du médecin, Fucidin H est appliqué 3 fois par jour sur la zone cutanée affectée.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Fucidin H peut-il provoquer?

L'utilisation de Fucidin H peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100)

Effets secondaires locaux tels qu'irritations de la peau, brûlures et démangeaisons

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1000)

Réactions d'hypersensibilité tels qu'eczéma, dermatite de contact ou éruptions cutanées

Une utilisation prolongée peut entraîner un amincissement de la peau aux endroits traités, une dilatation des petits vaisseaux sanguins superficiels, la formation de vergetures bleues-rouges, une rosacée, une augmentation de la pilosité corporelle, des changements pigmentaires, des saignements cutanés sur de petites surfaces et une augmentation de la transpiration. En cas d'utilisation à proximité des yeux, un glaucome (augmentation de la pression oculaire) peut se produire.

Réaction de sevrage après la fin du traitement: après une utilisation continue pendant une période prolongée, une réaction de sevrage peut se produire après la fin du traitement. Un ou plusieurs des symptômes suivants peuvent se manifester: rougeur de la peau pouvant s'étendre au-delà de la zone traitée, sensation de brûlure ou de picotement, démangeaisons fortes, peau qui pèle, cloques ouvertes et suintantes.

Chez les enfants, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants, il faut tenir compte du fait que le principe actif passe davantage dans la circulation sanguine, de sorte que des troubles de croissance peuvent survenir en cas d'utilisation prolongée.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

À utiliser dans les 3 mois après ouverture.

Remarques concernant le stockage

Conserver bien fermé et ne pas conserver au-dessus de 30°C.



Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Les médicaments périmés doivent être rapportés à la pharmacie pour élimination.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Fucidin H?

Principes actifs

20 mg/g d'acide fusidique (sous forme d'acide fusidique hémihydraté) et 10 mg/g d'acétate d'hydrocortisone

Excipients

Alcool cétylique 111 mg/g, glycérol 85%, paraffine liquide, polysorbate 60, vaseline blanche, eau purifiée, acide chlorhydrique (pour ajustement du pH), hydroxyanisole butylé (E 320) 0,04 mg/g, α -tocophérol (E 307) et sorbate de potassium (E 202)

Numéro d'autorisation

54283 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Fucidin H? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage avec 1 tube de 15 g

Titulaire de l'autorisation

Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Kloten

Domicile: Zurich

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

