

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SIMILASAN Bruciori di stomaco, pastiglie

Medicamento omeopatico

Quando si usa *SIMILASAN Bruciori di stomaco* ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici *SIMILASAN Bruciori di stomaco* può essere usato in caso di Bruciore di stomaco (pirosi); Acidità di stomaco; Fermentazione gastro-intestinale accompagnata da acidità di stomaco; Bruciore di stomaco dopo il consumo eccessivo di caffè, tabacco e alcolici.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Rivolgersi a un medico se i disturbi persistono senza interruzione e non si osserva alcun miglioramento nel giro di due settimane.

Si consiglia di evitare il consumo di caffè, tabacco e alcolici.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere *SIMILASAN Bruciori di stomaco*.

Quando non si può assumere *SIMILASAN Bruciori di stomaco* e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

SIMILASAN Bruciori di stomaco non deve essere usato nei bambini sotto i 12 anni.

Se sa di essere intollerante agli zuccheri, assuma *SIMILASAN Bruciori di stomaco* solo dopo aver consultato il suo medico.

Questo medicamento contiene 241,25 mg di lattosio (1,0158 g/2 g di glucosio e 1,0158 g/2 g di galattosio) per dose. Ciò è da tenere in considerazione nelle persone affette da diabete mellito.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere *SIMILASAN Bruciori di stomaco* durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare *SIMILASAN Bruciori di stomaco*?



Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Adolescenti (sopra i 12 anni) e adulti:

- **Sintomi acuti:** 1 pastiglia più volte al giorno (fino ad ogni quarto d'ora).
- **Fino alla completa guarigione:** 1 pastiglia 3 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Far sciogliere la pastiglia in bocca (eventualmente masticandola) e distribuirla con la lingua sulle mucose della bocca.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

Non indicato per bambini sotto i 12 anni

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN Bruciori di stomaco*?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con *SIMILASAN Bruciori di stomaco* e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di *SIMILASAN Bruciori di stomaco*. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene *SIMILASAN Bruciori di stomaco*?

1 compressa da 250 mg contiene

Principi attivi

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D15 / Natrium phosphoricum (HAB) D12 / Strychnos nux-vomica (HAB) D10 (Ph.Eur. Hom. 1.1.8) in parti uguali da 8,33 mg.

Sostanze ausiliarie



Lattosio 241,25 mg / amido di mais / magnesio stearato

Numero dell'omologazione

46529 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *SIMILASAN Bruciori di stomaco*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: 60 compresse

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

